

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.


We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

FL 45 C32.5



Digitized by Googl

DEC 22 1937 Blown thiffy - 6 g

Dott.i Ignazio Çerio e Raffaello Bellini

FLORA

del!'Isola di Capri

OSSIA

GUIDA PER LA RICERCA DELLE PIANTE

CHE CRESCONO SPONTANEE NELL' ISOLA



NAPOLI EMILIO PRASS

_____000 I goo

HARVARD UNIVERSITY

THE GIFT OF E.D. Mervill Digitized by Google.

Dott.i Ignazio Cerio e Raffaello Bellini

FLORA dell' ISOLA di CAPRI

OSSIA GUIDA PER LA RICERCA DELLE PIANTE

CHE CRESCONO SPONTANEE NELL'ISOLA



NAPOLI
EMILIO PRAS S
LIBRAIO-EDITORE
1900

Proprietà letteraria.

Napoli, Tipi Pierro e Veraldi nell' Istituto Casanova



rono per l'addietro chiarissimi professori e distinti cultori di botanica. I primi studi sulla medesima rimontano alla fine dello scorso

secolo; infatti da una lettera dell' Hadrava (1) sappiamo che il Dott. Giraldi nel 1775 raccolse le piante più caratteristiche dell'isola, delle quali ne fece il Bertoloni menzione nella sua *Flora italica*.

Pochi anni dopo il Graeffer, giardiniere del re di Napoli, segui gli stessi studi proponendosi di pubblicare i risultati; però non tradusse in atto il suo divisamento.

Verso i primi anni di questo secolo (1811) Tenore e Gussone, insieme al Casale, esplorarono l'isola e le piante raccolte trovansi citate nelle loro opere (2).

⁽¹⁾ Hadrava N. Bagguagli di varii scavi e scoverte di antichità fatte nell'isola di Capri. Napoli 1793. Lettere VI e XXIII.

⁽²⁾ Gussone G. Catalogo di piante che riguardano Capri e Castellammare. Giornale encicl. napoletano. Anno V. Vol. I. Napoli 1812.

Tenore M. Memoria sulle peregrinazioni botaniche effettuate

Nel 1824 l'Herbich pubblicava un articolo sulla flora di Capri (1).

Ma un catalogo speciale della flora dell'isola devesi all'operosità del prof. G. A. Pasquale, il quale nel 1840 lo rendeva di pubblica ragione nelle Esercitazioni accademiche degli Aspiranti Naturalisti fondata da O. G. Costa (2); fu questo, come dice lo stesso autore, un lavoro giovanile e preparatorio quasi della dotta memoria sulla flora vesuviana comparata alla caprense, da lui presentata nel 1868 all' Accademia Reale di Napoli (3). La memoria suddetta è ora divenuta rarissima e reperibile soltanto nelle principali biblioteche; essa fu l'ultima pubblicazione sulla flora dell'isola; d'allora in poi non segui che qualche nota isolata.

Ma, come si comprenderà facilmente, dopo più di 30 anni molt'altro vi è da aggiungere su tale argomento. Rimangono tuttora inediti i risultati di molte esplorazioni posteriori; specialmente di quelle della signora Spencer, inglese, del generale medico tedesco Dr. Huethe, dei giovani botanici napoletani Guadagno e Migliorato e delle nostre.

D'altra parte è utile osservare come la topografia dell'isola in quest' ultimo quarto di secolo abbia subito notevoli cambiamenti pel dissodamento di estesi macchieti e per la costruzione di parecchi chilometri

nella provincia di Napoli. Atti R. Accad. delle Scienze di Napoli. 1832. Vol. III. parte II, p. 96 a 98.

⁽¹⁾ Botanischer Ausflug nach der Insel Capri — Botanische Zeitung 1824.

⁽²⁾ Costa O. G. Statistica fisica ed economica dell'isola di Capri. Esercitazioni Acc. Aspir. Naturalisti. Vol. II. Parte 1.

⁽³⁾ Pasquale G. A. Flora vesuviana ecc. confrontata con quella dell'isola di Capri ecc. Memoria del socio G. A. Pasquale letta nella tornata del 3 Ottobre 1868 — Atti Acc. Scienze fisiche e matematiche. Napoli 1869.

di strade rotabili, che si sostituirono a sentieri fiancheggiati da siepi. Tali modifiche, insieme ad altre di secondaria importanza, furono la causa della sparizione di molte specie, che, riportate dal Pasquale, nessuno ha mai più rinvenuto (1).

Queste considerazioni e le premure fatteci da molti amici botanici esteri ed italiani, i quali hanno mostrato il desiderio di avere una guida nelle loro peregrinazioni, ci hanno indotti a pubblicare questo volumetto, in cui abbiamo escluso le specie coltivate od importate, ma abbiamo compreso quelle non più rinvenute in questi ultimi anni potendosi forse un giorno ritrovare in qualche angolo inaccessibile oggidi, e per maggior comodità dei forestieri abbiamo aggiunto i nomi volgari delle specie esistenti in Germania, in Inghilterra ed in Francia.

DR. R. BELLINI, DR. I. CERIO



⁽¹⁾ Invano si cercherebbero l' Himanthoglossum hircinum, la Vinca minor, la Datura stramonium, ecc.; la Tulipa praecox è reperibile rare volte in Anacapri.

INTRODUZIONE

Antiqui, saxosa Telonis Insula.... Silio (Ann. IV, 68).

All'entrata meridionale del golfo di Napoli ed a 35 km. da questa città si eleva mollemente dalle onde la ridente isola delle sirene, da 18 secoli celebre ed ammirata. Nota per il soggiorno di Augusto e di Tiberio, per le grandiose ville da questi imperatori costruite, per il suo cielo, per il suo mare, per i suo splendidi e rocciosi paesaggi, l'isola di Capri e la meta di un gran numero di visitatori, molti del quali vi si recano a bella posta per raccogliere ed osservare le sue naturali produzioni.

È posta sotto il 40°,33 di lat. N. ed 11 long. W. Dal lato orientale è divisa dalla punta della Campa-

nella, lembo estremo della Penisola Sorrentina, da un tratto di mare di 6 km., e dall'occidentale dista 25 km. dall'isola d'Ischia. La sua circonferenza è di 16 km.; ne misura 6 nella sua massima lunghezza e 3 nella sua maggior larghezza. È divisa in due comuni, Capri ed Anacapri, di cui l'ultimo occupa i due terzi dell'intera superficie dell'isola. (10 km.)

Il comune di Capri costituisce ad un tempo la parte più bassa e più montuosa dell'isola. I colli di Tiberio (il più elevato essendo 340 m. s. m.), Tuoro, S. Michele, Telegrafo e Castiglione dal lato di terra sono divisi da fertili ed amene vallette dove sorgono il centro dell'abitato e le piccole borgate, mentre dalla parte del mare vi s'immergono od a picco in forma di maestose rupi, quasi nude di vegetazione, od in ripidi pendii ricoperti da macchieti o ridotti a ripiani dove vegetano la vite e l'olivo.

Il Monte Solaro (618 m. s. m.) a guisa di enorme muraglia separa il comune di Capri da quello di Anacapri ad occidente; la sua vetta è occupata da un altipiano cinto di roccie dentellate e scoscese ed il territorio di Anacapri si estende da ponente alle sue falde come vasta pianura appena interrotta da lievi ondulazioni del 'spolo, coltivata ed ubertosa, la quale in dolce declivio giunge sino al mare.

L'isola è essenzialmente costituita da calcare compatto dell'epoca cretacea stratificato solo in qualche punto, come a Carena, a Ventroso, alla Grotta Verde, ecc. Però l'avvallamento tra il Monte Solaro ed il celle di Castiglione risulta di marne, arenarie ed argille sovrapposte al calcare. Queste ultime trattengono le acque piovane che s'infiltrano nel sottosuolo e da cui scaturiscono come scarse sorgenti. I declivi e gli avvallamenti delle colline sono ricoperti da tufi sani-

dinici di trasporto, raggiungenti in alcuni punti 8 o 10 metri di spessore e che, insieme al detrito del calcare, dell'arenaria ed all' humus costituiscono il suolo coltivabile dell'isola.

Il clima di Capri è mite e dolce e non vi si riscontrano che assai di rado le temperature estreme del vicino continente. I calori estivi sono temperati dalle brezze spiranti quasi continuamente da ponente; nei giorni più caldi il termometro rare volte raggiunge i 30°. Nell'autunno e nell'inverno soffiano talvolta impetuosi i venti del nord o dell'ovest; ma il gelo, le forti brinate e le nevi si hanno soltanto in qualche inverno di rigore eccezionale. I venti meridionali, i quali attraversano una grande distesa di mare, apportano sull'isola un modico grado di umidità per nulla nociva agli uomini ed assai benefica alla vegetazione. Il numero dei giorni piovosi dell'anno è notevolmente minore di quelli della vicina terraferma per la mancanza di alte montagne e di fitte boscaglie, le quali valgono tanto a trattenere le nubi avportatrici delle benefiche pioggie.

Vegetano e prosperano nell'isola gli agrumi, l'olivo e la vite, costituenti la principale risorsa agricola del paese; in ogni campicello si coltivano poi leguminose, cereali ed ortaglie; ma tutto ciò è ben lungi dall'essere sufficiente ai bisogni della popolazione.

Abbiamo dato questo rapido sguardo descrittivo all'isola di cui imprendiamo a trattare la flora, soltanto perchè si possa avere un'idea della sua costituzione e climatologia, le quali hanno tanta influenza
sulla vegetazione; chiuderemo questa introduzione riassumendo quanto già aveva osservato il prof. Pasquale,
cioè che sebbene Capri offra in generale le stesse
piante della Regione Vesuviana e dei Campi Flegrei

tuttavia per il predominio di alcune specie e per la mancanza di altre può bene ritenersi avere quest' isola una flora di fisonomia tutta sua propria, di cui non deve sfuggirci la relativa ricchezza, contandosi circa 700 specie in un'area di soli 10 km.², mentre lo stesso numero non è di molto sorpassato in tutta la regione vesuviana, avente una superficie di oltre 100 km.²

ABBREVIAZIONI E SEGNI

- (1) Pianta annua.
- 2 Pianta bienne.
- 24 Pianta perenne erbacea.
- † Pianta legnosa.
- 書 Pianta arborea.

I nomi posti in parentesi sono quelli dei sinonimi. Le sottospecie sono indicate con lettère greche.

Le varietà sono distinte con lettere latine.

AUTORI

Aiton	Ait.	Brotero	Brot.
Allioni	All.	Brougniart	Br.
Babington	Bab.	Brown Rob.	R. Br.
Balbis	Balb.	Carrière	Car.
Barrelieri	Barr.	Cassini	Cass.
Bartling	Bart.	Cavanilles	Cav.
Bernhardi	Bernh.	Chaix	Chaix
Bertolini	Bert.	Chavannes	Chav.
Bivon	Biv.	Cirillo D.	Cyr.
Boissier et	Boiss. et H.	Clairion	Clair.
Heldreich		Colladon?	Col.
Bolle Ch.	Bolle	Courtois	Court.
Bory	Bory	Crantz	Crantz

Curtis	Curt.	Hudson	Huds.
De Candolle	D. C.	Jacquin	Jaq.
De Candolle	D. C. fil.	Jan ka	Jan.
filius		Jordon	Jord.
Delarbre	Del.	Kitaibel	Kit.
Desfontaines	Desf.	Koch	Koch
Desrousseaux	Desr.	Koeler	Koel.
Desvaux	Desv.	Kutzing	Kutz.
Don Georges	Don	Lamarck	Lam.
Dufresne	Dufr.	Lapeyrouse	Lapeyr.
Dumortier	Dum.	l' Heritier	l' Herit.
Durieu	Dur.	Link	Lk.
Ehrhart	Ehrh.	Linnė	L.
Endlicher	Endl.	Loiseleur	Lois.
Forskal	Forsk.	Mertens et	M. et K.
Fries	Fr.	Koch	
Gaertner	Gaert.	Meyer	Mey.
Gasparrini	Gasp.	Miller	Mill.
Gaudin	Gaud.	Moench	Moench
Gawland	Gawl.	Moquin-Tan-	Moq. Tand
Gay	Gay	don	•
Gmelin	Gm.	Moris	Moris
Godron	Godr.	Murray	Murr.
Gouan	Gou.	Mutel	Mut.
Grenier et	Gr. et Godr.	Palisot de	Palis.
Godron		Beauvois	
Grisebach	Griseb.	Palisot de	P. B.
Gussone	Guss.	Beauvois	
von Haller	Hall.	Parlatore	Parl.
Heldreich	Heldr.	Pasquale	Pasq.
Hoffmann et	Hoff. et Link.	Persoon	Pers.
Link		Petagna	Pet.
Hooker	Hook.	Poiret	Poir.
Host	Host	Pollich	Poll.

Rafinesque Raf. Swainson Sw. Ramond Ram. Swartz Sw.	
Ramond Ram. Swartz Sw.	
D:1 1 1 D:1 M : : M M	
Reichenbach Reich. Targioni-Toz-Targ.	
Retzius Retz. zetti	
Richard Rich. Tenore Ten.	
Roemer et R. et Sch. Thunberg Thunb.	
Schultz Timbal-La- Timb.	
Rohde Rohde grave	
Roth Rot. Tinant Tin.	
Savi Savi Trattinich Tratt.	
Schimper Schimp. Trinius Trin.	
Schkuhr Schk. Ucria Ucria	
SchlechtendalSchlecht. Vahlenberg Vahl.	
Schrader Schrad. Vaucher Vauch.	
Schreber Schreb. Villars Vill.	
Sebastiani Seb. Visiani Vis.	
Serres Serr. Viviani Viv.	
Sibthorp Sib. Waldstein et W. et K.	
Sibthorp et S. et Sm. Kitaibel	
Smith Webb Webb	
Scopoli Scop. Weihe et W. et N.	
Smith Sm. Nees	
Spach Spach Wibel Wib.	
Sprengel Spr. Willdenow Willd. e W	7.
Steudel Steud. Withering With.	

BIBLIOGRAFIA CRONOLOGICA

(Pubblicazioni che direttamente od indirettamente riguardano la Flora dell' isola).

- 1811. Gussone e Casale. Peregrinazioni botaniche eseguite nel distretto di Castellammare. Giornale enciclopedico di Napoli. Anno IV.
- 1811-38. Tenore M. Flora napoletana.
- 1812. Gussone G. Catalogo delle piante che riguardano Capri e Castellammare. — Giornale enciclopedico di Napoli. Anno VI. Vol. I.
- 1824. Herbich Fr. Botanischer Ausflug nach der Insel Capri. Botanische Zeitung.

- 1825. Tenore M. Flora medica generale e flora speciale della provincia di Napoli.
- 1831. Tenore M. Sylloge plantarum vascularium Floræ Neapolitanæ hucusque detectarum. Neapolis (con 5 appendici).
- 1832. Tenore M. Memorie sulle peregrinazioni botaniche effettuate nella provincia di Napoli. — Atti R. Accademia delle Scienze di Napoli. Vol. III parte II pag. 96 a 98.
- 1832. Bertoloni. Discorso sopra la storia ed i progressi della botanica insulare italiana. — Annali di Storia Naturale. Bologna.
- 1834. Mangoni R. Ricerche topografiche ed archeologiche sull'isola di Capri. Napoli.
- 1835. ALVINO F. e QUARANTA B. Le antiche ruine dell'isola di Capri. Napoli.
- 1840. Statistica fisica ed economica dell'isola di Capri, con 6 tavole. Esercitazioni accademiche degli aspiranti naturalisti, ovvero raccolta di memorie dell'Accademia di tal nome, fondata e diretta dal Dott. O. G. Costa. (La parte botanica è fatta dal socio G. A. Pasquale).
- 1846. Chevalley De Rivaz. Voyage de Naples à Capri et à Paestum, exécuté le 4 Octobre 1845 à bord du bateau à vapeur le Stromboli.

- 1865. Bolle Charles. Narcissus Aschersonii. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali. Vol. VIII. Milano.
- 1868. Pasquale G. A. Nota su di alcune piante da pochi anni naturalizzate nella provincia di Napoli. — Rendiconti dell'Accademia Pontaniana. 1868.
- 1869. PASQUALE G. A. Flora vesuviana o Catalogo delle piante del Vesuvio confrontato con quelle dell' isola di Capri e di altri luoghi circostanti. — Atti della R. Accademia delle Scienze di Napoli. Napoli 1869. Stamperia del Fibreno.
- 1877. Jackson Gillbanks. Plants in the island of Capri. « The Garden » A weekly illustrated journal to horticulture. Vol. XI. London.
- 1878. Pasquale G. A. Notizie botaniche relative alle provincie meridionali d'Italia pel 1878. Rendiconto della R. Accademia delle Scienze di Napoli.
- 1892. Martelli e Tanfani. Le fanerogame e le protallogame raccolte durante la riunione generale in Napoli della Società Botanica Italiana nell' Agosto 1891 Nuovo Giornale Botanico Italiano. Firenze. Fasc. 3.º, Luglio.
- 1893. Knuth Dr. Paul. Blütenbiologische Beobachtungen auf der Insel Capri. Gent.

- 1893-94. CORNAZ E. La flore de Naples du premier printemps. — Bullett. Soc. Sc. Nat. de Neuchâtel.
- 1894. MATTEUCCI D. Una gita alle isole d'Ischia e Capri nell'Agosto 1891. — Iesi, Ruzzini.
- 1894. Cuomo V. L'isola di Capri come stazione climatica. Napoli.
- 1896. MIGLIORATO E. Prima nota di osservazioni relative alla flora napoletana. — Bullettino della Società Botanica Italiana. Firenze, pag. 168.
- 1897. MIGLIORATO E. Seconda nota di osservazioni relative alla flora napoletana. Bullettino Società Botanica Italiana. Firenze, pag. 23,
- 1898. De Gasparis Dr. A. e Bellini Dr. R. Alcuni schiarimenti su di una speciale produzione dell'isola di Capri. Rivista Italiana di Scienze Naturali. Anno XVII, n. 7-8. Siena.
- 1898. Guide to Capri by an English Resident.— Napoli. Tip. F. Giannini e figli. (A pag. 30 è dato un rapido sguardo alla flora).

DESCRIZIONE

di alcune piante speciali o notevoli

(v. tavola)

Medicago caprensis, Pasquale, Statist. fisica ed econom. dell'isola di Capri p. 48 Tav. II.

Medicago hirsuto-canescens, caule prostrato, foliolis obovatis vel obcordatis, apice denticulatis; stipulis ovatis; pedunculis brevissimis; leguminibus glabris cochleatis depressis utrinque planis; cyclis ternis, approximatis, aculeis raris rectis divergentibus, apice subhamatis (Pasquale). *Mulo (majo)*.

Convolvulus Cneorum L. sp. 157 — Convolvulus cauli suffruticoso foliisque lanceolatis obtusis argentinis tomentosis; floribus corimbosis, calycibus hirsutis, corolla alba rubente.

Campanula fragilis, Cyr. rar. neap. I 32.

Campanula cauli adscendenti, tuberculoso, ramis diffusis vel erectis; foliis petiolatis serrato-dentatis, ovatis, inferioribus cordatis, crassiusculis; floribus paucis terminalibus; corolla subplanata.

Lithospermum rosmarinifolium, Tenore pr. LXVI. Lithospermum cauli ramosissimo, glabro; foliis linearis vel linearis lanceolatis, subtus canescentibus. Corolla calycis circa triplo majori.

Statice cumana, Tenore fl. nap. III 351.

Statice foliis spatolatis, pubescentibus; cauli ramosissimo; ramis pubescentibus hirtis, inferioribus sterilibus; floribus erectis, remotis; bracteis glabris; calyci lobis 5 oblongatis.

Narcissus Aschersoni, Bolle, Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Vol. VIII.

Narcissus floribus parvis (cm. 1), corona expansa, marginis plus minusve crenato.

Asperula tomentosa, Ten. fl. nap. prod. XII.

Asperula omnino tomentosa; ramis prostratis, tetragonis (1-4 dm.); foliis verticillatis quaternis (infimis obovatis, superioribus oblongo-linearibus, obtusis, inaequalibus); floribus corimbosis terminalibus; corolla imbutiformi, hirsuta, tubo longiusculo; acheniis hirsutis.

CRYPTOGAMAE VASCULARES

FILICINEAE

Polypodiaceae

- 1. **Ophioglossum lusitanicum.** L. Natterzunge, Ophioglosse du Portugal. Novembre. Nei prati del Monte Solaro.
- 2. Ceterach officinarum. W. Schuppen Voll-Farn, Ceterach, Cetérach, herbe à dorer. — (Grammitis ceterach Sw.) — Gennaio-Marzo. 24
- 3. Polypodium vulgare. L. Gemeiner Tüpfelfarn, Common polypody, Polypode. — Maggio-Giugno. 24
- 4. Grammitis leptophylla. Sw. Small Grammitis, Grammite de feuilles menues. Aprile. (1)
- 5. Nephrodium rigidum. Desv. Polystic Roide.

- (Aspidium pallidum Bory; Asp. rigidum var. australe Hook.). Riugno-Agosto. 24.
- 6. Asplenium Adianthum-nigrum. L. Schwarzer Milz, Black spleenworth, Capillaire noire. Primavera, Autunno. 21
 - β acutum. (Bory) (A. Virgilii Guss.).
- 7. Trichomanes. L. Braunstieliger Milz-und Streifenfarn, Common spleenworth, Polytric, Capillaire. Estate. 21
- 8. Scolopendrium officinarum. Sw. Gemeine Hirschzunge, Hart's-tongue, Scolopendre, Langue de cerf. Estate. 21
- 9. Hemionitis. Sw.—Scolopendre sagittée. Grotta di Matromania. Estate. 21. (Citato dal prof. Pasquale).
- 10. Adianthum capillus Veneris. L. Maidenhair, Capillaire de Montpellier. Estate. 24
- 11. Pteris aquilina. L. Bracken, Fougère commune, grande fougère. 24

Selaginellaceae

1. Selaginella denticulata. Lam. — (Lycopodium denticulatum L.) — Sélagine denticulée. — Giugno-Agosto. 24

GYMNOSPERMEAE

Coniferae

- 1. Pinus pinea. L. Kiefer, Stone pine, Pin cultivé, Pin pinier. Aprile. \dagger
- 2. halepensis. Mill. Aleppo Pine, Pin blanc, Pin de Jerusalem. Aprile.

 Raro.

- 3. Pinus montana. Duroi. (P. mughus Scop. P. uncinata Ram.) Pin λ crochets. Maggio-Luglio.

 ₹. Raro.
- 4. Juniperus phoenicea. L. Genévrier de Phénicie — Grotta azzurra, Limbo. — Maggio. 5

MONOCOTYLEAE

Poaceae

- 1. Aegylops ovata. L. EGILOPE OVALE. Aprile-Maggio. (1)
- 2. Psilurus nardoides. Trin. (Rottboellia monandra Cav. Nardus aristata L.) Psilure faux-nard. Aprile-Giugno. (1)
- 3. Rottboellia incurvata. L. (Lepturus incurvatus Reich. Aegylops incurvata L.). Gekrümmter Dünnschwanz, Lepture à epi courbée. Maggio. (1)
- 4. Lolium perenne. L. (L. tenue L.). Englisches Raygras, Perennial darnel, Ray-grass, Gazon anglaise. Maggio-Giugno. 24
- 5. multiflorum. Gaud. Italienisches Raygras, Ivraie multiflore. Maggio. (1)
- 6. temulentum. L.—(L. robustum Reich.).
 TAUMEL LOLCH, BEARDED DARNEL, IVRAIE. —
 Aprile-Giugno. (1)
- 7. Gaudinia fragilis. PB. (Avena fragilis L.). Zerbrechliche Gaudinie, Gaudinie fragile. Maggio. ①

- 8. Hordeum murinum. L. Mäuse-Gerste, Wall Barley, Orge des murs. Aprile. 24
 - — β. leporinum. (Lam.) Orge
- 9. bulbosum. L. Orge bulbeuse. Maggio-Giugno. 24
- 10. vulgare. L.—Gemeine-Gerste, Escourgeon. — Maggio-Giugno. (1)
- 11. Sclerochloa maritima. Lam. Meerstrands-Schwingel, Sea Poa, Paturin maritime. Maggio. (1)
- 12. rigida. Panz. Starrer Schwin-GEL, Hard POA, PATURIN ROIDE. - Giugno. (1)
- 13. Catapodium Ioliaceum. Lam. CATAPODE FAUSSE-IVRAIE. Aprile-Maggio. (1)
- 14. Brachypodium pinnatum. PB.—(Bromus pinnatus L. B. phoenicoides L. Festuca phoenicoides Bert.) Gefiederte Zwenke, Heath falsebrome, Brachypode corniculé. Maggio-Giugno. 24
- 15. distachyon. R. et S. (Bromus distachyos H. st.) Brachypode cilié. Aprile-Maggio. (1)
- 16. ramosum. R. et S. Brachypode rameux. Aprile-Maggio. 24
- 17. mollis. L. (Serrafalcus mollis Parl.)
 Weichhaarige Trespe, Brome mollet. Aprile. (1)
- 18. Bromus maximus. Desf. (B. Gussonii Parl.)
 Brome élevé. Aprile. (1)
- 19. sterilis. L. Var. gigantea. Taube Trespe, Barren brome-grass, Brome stérile. Aprile. ① Anacapri.
- 20. madritensis. L.—Brome de Madrid.—
 Aprile. ①

- 21. Bromus tectorum. L. Dach-Trespe, Brome Des toits. Aprile-Giugno. (1)
- 22. erectus. Huds. Aufrechte Trespe, Upright perennial Brome-grass, Brome dressé. — Maggio-Giugno. 24
- 23. Vulpia myuros. Gm. (Festuca myuros L.) Mäuseschwanz Schwingel, Rat's tail fescus, Vulpie Queue-de-rat. Aprile. (1)
- 24. ciliata. Lam.—Vulpie queue-de-rat. Aprile. (1)
- 25. Festuca alopecuros. Lam. (Vulpia alopecuros Lam.) Maggio-Giugno. ①
- 26. ovina. L. Schaf-Schwingel, Sheep's fescue grass, Poil-de-chien—*Maggio-Giugno*. 24
- 27. silvatica. Vill. (F. exaltata Presl., Poa trinervata Parl.)—Wald-Schwingel, Slender wood fescue grass, Fétuque des bois. Giugno. 24
- 28. Tragus racemosus. Hall. Traubenblütiges Stachelgras. Bardanette en grappe.—Giugno-Agosto. ①
- 29. Dactylis hispanica. Roth. Gemeines Knaulgras, Dactyle aggloméré.—Maggio-Giugno. 24
- 30. glomerata L. Gemeines Knaulgras, Rough cock's-foot-grass, Dactyle aggloméré. Aprile-Maggio. 24
- 31. Sesleria tenuifolia. Schrad. Febbraio-Aprile. 24. Scala d'Anacapri.
- 32. Poa bulbosa. L. B. viviparaKoch. ZWIEBELIGES
 RISPENGRAS. BULBOUS POA, PATURIN BULBEUX. —
 Marzo-Aprile. 4
- 33. annua L. Einjähriges Rispengras, Annual meadowgrass, Paturin annual Febbraio-Aprile. ①

- 34. Poa compressa. L.—Zusammengedrücktes Rispengras, Flattened poa, Paturin comprimé. Giugno. 24
- 35. Eragrostis major. Host.—(E. megastachya Link.)
 GROSSÄHRIGES LIEBESGRAS, ERAGROSTIDE AMOURETTE. Agosto-Settembre. ①
- 36. Briza minor. L. Small quaking-grass, Brize mineure. Aprile. ①
- 37. maxima. L.—Large quaking-grass, Brize à gros épillets. Aprile. ①
- 38. Cynosurus echinatus. J. Rough dog's-tailgrass, Brize mineure. — Aprile. (1)
- 39. elegans. Desf. Cynosure elegant.

 Maggio: ①
- 40. Setaria verticillata. PB. (Panicum verticillatum L.). Quirlblättriger Fennich, Love grass, Setaire verticillée. Agosto-Ottobre. ①
- 41. viridis. PB. (Panicum viride L.) Grüner Fennich, Purple Grass, Setaire verte. Ottobre. (1)
- 42. glauca. PB. (Panicum glaucum L.)—
 Gelbhaariger fennich, Setaire glauque. —
 Settembre. (1)
- 43. Digitaria sanguinalis. Scop. (Panicum sanguinale Host.) Blut-Hirse, Cock's foot finger-grass, Manne terrestre, Sanguinale. Agosto. (2)
- 44. Cynodon dactylon. Pers. Gefingerter Hundszahn, Creeping dog's-tooth-grass, Chiendent. Giugno. 24
- 45. Alopecuros utriculatus. Pers. (Phalaris utr. L., Tozzettia utr. Savi.) Schlauchartiger Fuchsschwanz, Vulpin à vessie. Maggio. ①

- 46. Phalaris canariensis. L. Kanarienhirse, Canary seed-grass, Alpiste. Aprile-Maggio. (1)
- 47. Phleum Michelii. All. β. ambiguum (Ten.) Micheli's Lische, Michelian cat's-tail-grass, Phléole de Micheli. Giugno. 24
- 48. Boehmeri. Wib. Böhmer's Lische, Phléole de Boehmer. Maggio-Giugno. 24.
- 49. Lagurus ovatus L. Ovate hare's-tail-grass, Lagure ovoïde. Maggio. ①
- 50. Gastridium lendigerum. Gaud. (G. australe PB.) NITGRASS, GASTRIDIE VENTRUE. Maggio. (1)
- 51. Stipa tortilis. Desf. Pfriemengras, Stipe tortillée. Marzo-Maggio. (1)
- 52. Piptatherum multiflorum. Palis. Maggio. 24. Nei siti a settentrione.
- 53. Agrostis vulgaris. With. Gemeines Straufgras, Agrostide vulgaire. — Luglio-Agosto. 24
- 54. Arundo donax. L.—Schilf, Grand Roseau, canne de Provence. Agosto-Settembre. 24.
- 55. Melica ciliata. L. Gefranztes Perlgras, Me-Lique ciliée. — Aprile-Maggio. 21. Anacapri.
- 56. coerulea. L.—(Molinia coerulea, Moench.)
 BLAUE MOLINIE, MOLINIEBLEUE. Aprile. 24
- 57. Koeleria phleoides. Pers. Kämmförmige Kölerie, Crested koeleria, Keulérie phléole. Aprile-Giugno. ①
- 58. Avena barbata. Brot. Avoine stérile. Maggio-Giugno. ①
- 59. sterilis. L. Avoine stérile. Aprile-Maggio. (1)
- 60. Anthoxanthum odoratum. L.—Gemeines Ruchgras, Sweet-scented vernal-grass, Flouve odorante. — Marzo. 24

- 61. Aira capillaris. Host.—Schmele, Cauche capillarie. Aprile. (1). Monte Solaro.
- 62. Corynephorus articulatus. PB.—Corynephore Articulé. Aprile. (1)
- 63. Holcus lanatus. L. (Avena mollis Pasq.) Wolliges Honiggras, Meadow soft-grass, Blanchard velouté. Giugno. 24
- 64. Sorghum halepense. Pers. Sorgho d'Alep.—
 Giugno. 24
- 65. Andropogon hirtum. L. Barbon hérissé. Maggio. 24
 - β. pubescens (Vis.) Barbon Hé-RISSÉ.
- 66. Ventenata avenacea. Koel. Ventenate avoine. Maggio-Giugno. (1)

Cyperaceae

- 1. Cyperus olivaris. Targ. Souchet officinal. Giugno-Agosto. 24
- 2. Carex distachya. Desf. (C. gynomane Bert., C. Linkii Schk.)—Carex à deux épis. Marzo. 24
- glauca. Mur. β, serrulata (Biv.) Meergrüne Segge, Glaucous carex, Carex glauque. Maggio. 21. Anacapri.
- verna. Will. (C. praecox Jacq.) Frühlings-Segge, Vernal Carex, Carex précoce. — Marzo-Aprile. 21.
- muricata. L. Sperrfrüghtige Segge, Fox-grass, Carex rude. — Maggio-Giugno. 24
- 6. Schoenus nigricans. L.—Schwärzliches Kopfriet, Black bog-rush, Choin noirâtre. — Maggio. 24

Lemnaceae

1. Lemna gibba. I.. — Buckelige Wasserlinse, Lenticule gonflée. — Maggio-Giugno. ①

Araceae

- 1. Arum italicum. Mill. Gouet d'Italie. Marzo. 24
- 2. Arisarum vulgare. Rchb. (Arum arisarum. L.) CAPUCHON. Dicembre. 24
- 3. proboscideum. Savi. Aprile-Maggio. 24

Palmae

1. Chamaerops humilis. L. 5 — Sulle roccie presso il mare a settentrione dell'isola.

Juncaceae

- 1. Luzula campestris. DC. (Juncus nemorosus. Host.) Gemeine Marbel, Field woodrush, Luzule des champs. Marzo-Maggio. 24
- Forsteri. DC. Forster's Marbel, Narrow leaved hairy wood-grass, Luzule de Forster.

Dioscoreaceae

1. Tamus communis. L.—Gemeine Schmeerwurz, Black briony, Taminier, Sceau de la vierge. — Aprile. 24

Asparagaceae

- 1. Ruscus aculeatus. L. Houx frelon, Petit Houx. Gennaio. †
- 2. Asparagus acutifolius. L.— Asperge à feuilles Aiguës. Agosto-Settembre. 24
- 3. Smilax aspera. L. Liseron épineux, Liser piquant. Settembre. 24

Liliaceae

- 1. Tulipa praecox. Ten. Tulipe oeil-du-soleil. Marzo-Aprile. 21. Anacapri; oggidi rara.
- 2. Lilium candidum. L. Lis, Lis commun. Maggio-Giugno. 24
- 3. bulbiferum. L. Feuer Lilie, Lis bulbifere. — Giugno. 24. Raro.
- 4. Ornithogalum nutans. L. Nickende Vogelmilch, Drooping star of Bethlehem.— Dicembre-Marzo. 24
- 5. umbellatum. L. EBENSTRÄUFsige Vogelmilch, Common star of Bethlehem, Dame d'onze heures. — Aprile-Maggio. 24
- 6. stachyoides. L. Maggio. 24
- 7. Urginea scilla. Steinh.—(Scilla maritima L.)—
 SQUILL, SQUILLE, SCILLE MARITIME. Marzo. 21.
 Comunissima.
- 8. Scilla autumnalis. L. Herbst Meerzwiebel, Autumnal squill., Scille d'automne. Agosto-Ottobre. 24
- 9. Bellevallia romana. Rchb. Bellevalie Ro-MAINE. — Marzo-Aprile. 24
- 10. Muscari comosum. Mill. Schopfblütige Bisamhyacinthe, Ail à toupet. Aprile. 24

- 11. Muscari botryoides. Mill. Steifblättrige Bisamhyacinthe, Muscari raisin. Marzo-Aprile. 21. (Trovato dal generale Huethe).
- 12. Allium chamaemoly. L. AIL FAUX MOLY. Novembre-Gennaio. 2. Monte Solaro.
- 13. ampeloprasum. L. (A. Gasparrini. Guss.) WILD LEEK, POIREAU D'ÉTÉ. Maggio. 21
- 14. magicum. L. (A. speciosum. Cyr.). AIL NOIR. Febbraio-Aprile. 24
- 15. multiflorum. Desf. AIL MULTIFLORE. Giugno. 24
- 16. subhirsutum. L. (A. ciliatum Cyr.) AIL CILIÉ. Marzo-Maggio. 24
- 1⁻. flavum. L. AIL JAUNE. Maggio-Giugno. 24
- paniculatum. L. β. pallens. (L.) AIL PA-NICULÉ. — Agosto. 24
- 19. γ. tenuiflorum (Ten.) Ail à tête ronde. Giugno. 24
- 20. roseum. L. β. bulbiferum—(A. carneum
 Ten.) AIL Rose. Aprile-Maggio. 24
- 21. triquetrum. L. Triquetrous Leek, Ail trigone. Maggio-Giugno. 24
- 22. vineale. L. Weinbergs Lauch, Crow Garlic, Ail des vignes. Maggio-Giugno. 21.

 Trovato dal generale Huethe.
- 23. Asphodelus ramosus. Gou. Bâton blanc.—
 (A. cerasiferus Gay.) 24
- 24. fistulosus. L. Asfodèle fistuleux. Aprile. 21. Marina di Mulo.
- 25. Aloe vulgaris. Lam. Maggio-Giugno. 24

Colchicaceae

1. Colchicum autumnale. L. — Herbst-Zeitlose, Common meadow saffron, Colchique, Veilleuse. — Settembre-Ottobre. 21. Monte Solaro.

Amaryllidaceae

- 1. Narcissus Tazetta. Lois. β. praecocior (Pasq.) —
 Narcisse à Bouquets. Ottobre-Marzo. 21
- 2. unicolor. Ten. Novembre-Gennaio. 24
- 3. Tenorii. Parl. β. Aschersonii (Bolle.) Febbraio. 24. Scoglio del Monacone.
- 4. Agave americana. L. Agosto. 24

Iridaceae

- 1. Crocus Imperati. (Ten.) Febbraio. 24. Nei macchieti e nelle selve.
- 2. Romulea bulbocodium. Seb. IXIA BULBOCODE. Aprile. 24.
- 3. Gladiolus segetum. Gawl. (G. communis Ten.) Siegwurz, Glayeul des moissons. Aprile. 24
- d. illyricus. Koch. β. inarimensis (Guss.)
 GLAYEUL D'ILLYRIE. Maggio. 24. Trovato dal generale Huethe.
- Iris florentina. L. Iris de Florence. Aprile. 24
- 6. Iris germanica. L. Deutsche Schwertlile, Flambe, Iris d'Allemagne. Aprile. 24
- 7. foetidissima. L. Fetid Iris, Gladdom, Iris GIGOT. Aprile. 24

Orchidaceae

- 1. Limodorum abortivum. Sw.—Unechter Dingel, Limodore à feuilles avortées. Aprile-Maggio. 21. Rarissimo al Monte Solaro. Trovato dal Guadagno nel 1896.
- 2. Neottia nidus-avis. Rich. Gemeines Vogelnest, Common bird's-nest orchis, Nid d'oiseau. Giugno-Agosto. 24. Rara.
- 3. Spiranthes autumnalis. Rich. Herbst Wendelorche, Common Lady's tresses, Spiranthe D'automne. Settembre-Ottobre. 24.
- 4. Serapias lingua. L. Helléborine. Aprile-Maggio. 24
- 5. parviflora. (Parl.) (S. occultata Gay.) HELLÉBORINE. — Aprile-Maggio. 24
- 6. cordigera. L. Sérapias en coeur. Aprile-Maggio. 24. Monte Solaro.
- 7. pseudo-cordigera. Moris. (S. longipetala Poll.) — Sérapias à longs pétales.— Marzo-Maggio. 21. Trovata dal generale Huethe.
- 8. elongata. Tod. Aprile-Maggio. 24
- 9. Aceras antropophora. Br. Menschenähnliches Ohnhorn, Man orchis, Aceras homme pendu. Maggio-Giugno. 24
- 10. Himanthoglossum hircinum. Spr.—Bocks Rie-MENZUNGE, ACÉRAS À ODEUR DE BOUC.—Giugno 专。 Probabilmente sparito.
- 11. Tinea cylindracea. Biv. (Orchis atlantica W.)
 Acéras à fleurs serrées. Marzo-Maggio. 24
- 12. Orchis rubra. Jacq. Marzo. 24
- 13. papilionacea. L. Orchis papilionacé. *Marzo*. 24

- 14. Orchis pyramidalis. L. Pyramidenförmige Hundswurz, Pyramidal orchis, Orchis pyramidal. Marzo. 4. Esiste anche la varietà a fiore bianco.
- 15. italica. Poir. (O. undulatifolia L., O. longicruris Lam.) Aprile. 24
- Simia. Lam. Affen Knabenkraut, Orchis singe. Maggio-Giugno. 24
- 17. coriophora. L.—Wanzen Knabenkraut, Orchis punaise. Maggio-Giugno. 24
- 18. maculata. L. (O. Bonanniana Tod.) Geflecktes Knabenkraut, Spotted orchis, Orchis taché. Giugno. 24
- 19. Cyrilli. Ten. (O. provincialis Balb.) Orchis de Provence. Aprile-Giugno. 24
- 20. Morio. L. Gemeines Knabenkraut, Green-winged orchis, Orchis Bouffon. Aprile-Maggio. 24
- mascula. L.—Männliches Knabenkraut, Early orchis, Orchis mâle.—Maggio-Giugno. 24. Trovata dal Guadagno nel 1897.
- 22. Ophrys myodes. Jacq. (O. muscifera Huds.) Fliegenähnliche Frauenthräne, Ophrys mouche. Maggio-Giugno. 24
- 23. exaltata. Ten. Marzo-Aprile. 24
- 24. bombilifera. Lam. (O. tabanifera Reich.) Ophrys Bombyx. Marzo-Aprile. 24
- 25. Arachnites. Host. Ophrys fausse-Araignée. — Aprile-Maggio. 24
- 26. aranifera. Huds. Spinnenähnliche Frauenthräne, Spider orchis, Ophrys araignée. Aprile-Maggio. 24
- 27. tenthredinifera. W. Ophrys à grandes fleurs. Aprile-Maggio. 24

28. Platanthera clorantha. Kust. — (P. montana Rehb.) — Orchis de montagne. — Maggio-Giugno. 24. Trovata dal Guadagno.

MONOCHLAMYDEAE

Salicaceae

- 1. Salix Caprea. L. SAAL-WEIDE, SALLOW, MAR-CEAU. — Aprile-Maggio. 5
- 2. Populus alba. L. Silber Pappel, White Poplar, Peuplier blanc d'Hollande. — Febbraio-Marzo. ‡
- 3. nigra. L.—Schwarz-Pappel, Black or Italian poplar, Léard, Liardier. *Marzo-Aprile*. †
- 4. tremula. L. ZITTER-PAPPEL, ASPEN, TREMBLE. Marzo-Aprile. 5

Betulaceae

1. Alnus cordifolia. Ten. — Aulne à feuilles en coeur. — Febbraio-Marzo. 🕏

Quercaceae

- 1. Quercus robur. L.—Sommer Eiche, Oak, Chêne commun, Rouvre, Gravelin. Aprile. 🕏
- 2. cerris. L. Chêne cerris. Aprile-Maggio.

 †

4. Quercus suber. L. — Chêne Liège. — Aprile-Maggio.

Urticaceae

- 1. Theligonum Cynocrambe. L.—Théligone étalé.
 (1). Abbondante.
- 2. Urtica dioica. L. Zweihäusige nessel, Common nettle, Grande ortie. Maggio-Ottobre. 24
- 3. pilulifera. L. s. pectinata (Pasq.) Pilletragende nessel, Roman nettle, Ortie à pilules. — Aprile. (1)
- 4. membranacea. Poir.—(U. caudata Vahl., U. neglecta Guss.) Ortie membraneuse. Ottobre-Giugno. (1)
- 4. urens. L. Brennessel, Small nettle, Ortie grieche, Petite ortie. Maggio-Novembre. (1)
- 6. Parietaria officinalis. L.—Gebräuchliches Glaskraut, Common Wall Pellitoky, Pariétaire. — Giugno. 24
 - — β. diffusa (M. et K.) (P. judaica L.).— Ausgebreitetes Glaskraut, Pariétaire.
- 7. cretica. L. (P. filiformis Ten.) Pariétaire de Soleirol. Febbraio-Maggio. ①
- 8. Ulmus suberosa. Ehrh. Окмели. Aprile-Maggio.

 †

Euphorbiaceae

- 1. Euphorbia spinosa. L. Euphorbe piquant. Marzo-Maggio. 24. Monte Solaro.
- 2. peplis. L. Purple spurge, Euphorbe des sables. Agosto-Settembre. ①

- 3. Euphorbia peplus. L. Garten Wolfsmilch, Petty spurge, Esule ronde. (1)
- 4. helioscopia. L. β. oegeta Pasq. Sonnenwendige Wolfsmilch, Sun spurge, Révellle-matin. Gennaio-Giugno. ①. Anacapri.
- 5. Characias. L. Euphorbe des val-Lons. — Febbraio-Marzo. 24. Comunissima.
- 6. dendroides. L. Euphorbe en arbre. Marzo-Maggio.

 5. Comunissima.
- 7. pinea. L. Euphorbe faux-pin. Maggio-Giugno. 2. Comunissima.
- 8. falcata. L. Sichelförmige wolfsmilch, Euphorbe mucroné. — Giugno-Agosto.
- 9. amygdaloides. L. Mandelblättrige wolfsmilch, Wood spurge, Euphorbe des Bois. Febbraio-Giugno. 24
- 10. Mercurialis annua. L. Einjähriges bingelkraut, Annual mercury, Mercuriale, Vignette. (1)
- 11. Ricinus communis. L.—Ricin, Palma-christi. Maggio-Settembre. Rarp.

Polygonaceae

- 1. Polygonum aviculare. L. Vogel Knöterich, Common knot-grass, Renouée, trainasse, herbe aux panaris. Giugno-Ottobre. ①
- 2. herniaroides. Del.—Renouée fausse herniaire. — Agosto-Settembre. (1)
- 3. convolvulus. L. Windenartiger Knöterich, Petite vrillée sauvage. Maggio. (1)
- 4. dumetorum. L. Hecken Knöte-Rich, Grande vrillée. — Agosto. ①

- 5. Rumex pulcher. L. Schöner ampfer, Fiddle dock, Belle patience. Maggio-Giugno. 24
- 6. bucephalophorus. L. Rumex tête-de-Boeuf. — Febbraio-Marzo. (1). Rarissimo.
- 7. arifolius. All. (R. montanus DC.). Aronblättriger ampfer, Rumex à feuilles de gouet. Luglio. 24. Anacapri.
- 8. acetosa. L. Sauer ampfer, Sorrel dock, Oseille commune, Surelle vinetté. Giugno-Luglio. 24. Anacapri, Castiglione.

Amarantaceae

- 1. Amarantus retroflexus. L. Rauhhaariger amarant, Amarante réfléchie Agosto. (1)
- 2. Blitum. L. (A. sylvestris Desf.). WILDER AMARANT, DOUBLE GEE WITH PRICKLY SEEDS, AMARANTE BLETTE. Settembre. (1)
- 3. viridis. L. Amarante verte.—
 Settembre. (1)
- 4. deflexus. I. (A. prostratus Balb.). Amarante couchée. Agosto. ①

Phytolaccaceae

1. Phytolacca decandra. L. — Phytolaque à dix étamines. — Luglio-Ottobre. 24

Chenopodiaceae

- 1. Atriplex angustifolium. L. Ausgebreitete melde, Common weed, Arroche étalée. (1)
- 2. Chenopodium murale. L. (Atriplex sylvestris Mat.). Mauer Gänsefuss, Nettle leavedfoot, Patte d'oie des murs. Luglio-Settembre. ①

- 3. Chenopodium album. L.— \(\beta \). glomerulosus (Moq. Tand.) Gemeiner Gänsefuss, White goosefoot, Arroche blanche. Agosto. (1)
- 4. opalifolium. Schrud. Schnee-BALLBLÄTTRIGER GÄNSEFUSS, ARROCHE À FEUILLES D'OBIER. — Luglio-Ottobre.
- 5. vulvaria. L. STINKENDER GÄNSEFUSS, STINKING GOOSEFOOT, ARROCHE PUANTE.

 Agosto-Ottobre. (1). Comunissimo.
- 6. Kochia saxicola. Guss. Agosto-Ottobre. 5
- 7. Salsola kali. L. β . Tragus (L.) Salzkraut, Prickly saltwort, Soude kali. Agosto. (1)

Daphnaceae

- 1. Thymelaea hirsuta. Endl. Passerine сотоиneuse. — Aprile-Ottobre.

 5. Faraglioni, Arco naturale, Telegrafo, Mulo.
- 2. Tartonraira. All. Passerine tartonraire. Aprile-Maggio. †
- 3. Daphne gnidium. L. Garou, Sain-Bois. Ago-sto-Settembre. $\,\pm\,$

Santalaceae

- 1. Osyris alba. L. Rouet. Aprile-Giugno. 💍
- 2. Thesium divaricatum. Jan. Thesion divariqué. — Giugno-Agosto. 24

Loranthaceae

1. Viscum album. L.—Weisse Mistel, Bird lime mistletoe, Gui des druides. — Febbraio-Maggio.

†. Raro.

THALAMIFLOREAE

Ranunculaceae

- 1. Clematis flammula. L. Clématite flammèle. Giugno. $\stackrel{\leftarrow}{\sim}$
- 2. vitalba. L. Gemeine waldrebe, Traveller's joy, Clématite des haies. Luglio.

 †. Rara.
- 3. Anemone hortensis. L. Anémone des jardins. Marzo-Aprile. 2. Comunissima.
- 4. apennina. L. Blue mountain anemous, Anémone des apennins. — Marzo-Aprile. 24
- 5. coronaria. L. Anémone couronnée. Marzo-Aprile. 21. Cesina, Unghia marina. — Rara.
- 6. Ranunculus chaerophyllos. L. (R. Agerii Bert.). Buttercup, Renoncule cerfeuil. Maggio 24. Monte Solaro.
 - β. flabellatus (Desf). RENONCULE CERFEUIL. — Monte Solaro.
- 7. muricatus. L.— Renoncule Herissée. Aprile-Maggio. (1). Nei seminati.
- 8. ficaria. L.—β. caltha efolius (Rchb.) FEIGWURZEL, FIGWORT RANUNCULUS, FICAIRE RENONCULE. Gennaio-Maggio. 24
- 9. Delphinium cardiopetalum. DC. Dauphinelle Effilée. Giugno-Settembre. ①. Tragara, Castiglione.
- 10. a) halteratum (S. et S.) Dauphinelle effilée.

- 11. Delphinium peregrinum. L. (D. junceum L.)
 DAUPHINELLE EFFILÉE. Maggio-Giugno. (1)
- 12. Nigella damascena. L. TÜRKISCHER SCHWARZ-KÜMMEL, LOVE IN THE MIST, NIGELLE DE DAMAS. Giugno-Agosto. (1). Comune.

Papaveraceae

- 1. Papaver hybridum. L. Bastard-Mohn, Rough Poppy, Pavot hybride. Maggio-Giugno. (1)
- 2. argemone. L. Sand-mohn, Pale poppy, Pavot argémone. Luglio.
- 3. dubium. L. (P. intermedium Beck.). Zweifelhafter mohn, Long-headed poppy, Pavot douteux. Aprile-Maggio. (1)
- 4. Rhoeas. L. Klatschrose, Field poppy, Pavot coquelicot. Aprile. ①
 forma minima.
- 5. Glaucium flavum. Crantz. (G. luteum Ten., Chelidonium glaucium L.) Gelber Hornmohn, Yellow Horned Poppy, Glaucienne Jaune. Aprile. (2)
- 6. Chelidonium majus. L. Grössere schellwurz, Common celandine, Grande chelidoine. Aprile-Settembre. 24
- 7. Fumaria capreolata. L. Rankender erdrauch. Fumeterre a vrilles. Aprile-Giugno. ①
- 8. officinalis. L. Gebräuchlicher Erdrauch, Common fumitory, Fumeterre officinale. Aprile. ①
- 9. Vaillanti. Lois.—Vaillant's erdrauch, Fumeterre de vaillant. Aprile. (1)
- 10. parviflora. Lam.—(F. leucantha Ten.) Kleinblütiger erdrauch, Fumeterre à petites fleurs. Aprile. ①

11. Fumaria serotina. Guss.— (F. confusa Joid., F. Gasparrini Bab.) — Aprile-Maggio. ①

Brassicaceae

- 1. Matthiola rupestris. Guss. Stock or GILLY FLOWER. Febbraio-Marzo. 21. Presso la Grotta azzurra.
- 2. Cheiranthus Cheiri. 1.. GOLDLACK, WALL FLOWER, GIROFLÉE VIOLIER. Aprile-Maggio. 24
- 3. Arabis collina. Ten. (A. rosea D.C.) Marzo 24. S. Michele.
- 4. verna. R. Brown. (Hesperis verna W.)
 ARABETTE PRINTANIÈRE. Marzo-Aprile. (1)
- 5. perfoliata. Lam. (Turritis glabra L.)
 TURMKRAUT, GLABROUS ROCKCRESS, TOURETTE
 GLABRE. Maggio-Giugno. (2)
- 6. Cardamine hirsuta. L. Behaartes schaumkraut, Hairy bittercress, Cardamine velue.— Gennaio. (1)
- 7. impatiens. L. Spring-schaumkraut, Narrow-leaved bittercress, Cardamine impatiente. — Maggio-Giugno. (1)
- 8. Sisymbrium officinale. Scop.—Gebräuchlicher Rankensenf, Hedge mustard, sysimbre officinal. Maggio. (1)
- 9. polyceratium. L.—Sysimbre corniculé. — Aprile. (1)
- 10. Thalianum. Gay. (Arabis Thaliana L. Thal's schmalwand, Wallcress, Arabette de thalius. Marzo-Maggio. (1)
- 11. Erysimum barbarea. R. Rrown. Winter-cresse, Barbarée commune. Aprile-Maggio.(2)
- 12. Brassica fruticulosa. Cyr. Gennaio-Dicembre. 24

- 13. Brassica incana, Ten.—GRAUER KOHL.—Aprile-Maggio. 21. Matromania, Scala d'Anacapri.
- campestris. L.—FIELD BRASSICA, CHOU 14. À FEUILLES RUDES. — Dicembre-Maggio. (1) (2)
- 15. Diplotaxis tenuifolia. DC. Schmalblättrige RAMPE, DIPLOTAXIDE À FEUILLES MENUES.—Aprile-Dicembre. 21. Comunissima.
- 16. Eruca sativa. Lam. (Brassica Eruca L.) WILD MUSTARD. ROQUETTE CULTIVÉE.—Febbraio-Maggio. (1)
- 17. Succowia balearica. Med. Aprile-Maggio. (1)
- 18. Raphanus raphanistrum. L. Hederich, Wild RADISH, RAVENELLE DES CHAMPS. - Marzo-Giugno. (1). Nei campi.
- 19. Cakile maritima. Scop. Gewöhnlicher meer-SENF, SEA ROCKET, COQUILLIER MARITIME. -Marzo. (1)
- 20. Alyssum maritimum. Lam. Dwarf candy-TUFT, ALYSSON MARITIME. - Gennaio-Dicembre. 24
- 21. Draba verna. L. Frühlings-hungerblume. WHITLOW GRASS, DRAVE PRINTANIÈRE. - Gennaio. (1)
 - β. praecox (Stev.) DRAVE PRINTANIÈRE. — Febbraio-Marzo.
- 22. Thlaspi Bursa-pastoris. L. Hirten Täschel, SHEPHERD'S PURSE, CAPSELLE BOURSE À PASTEUR. Febbraio-Dicembre. (1)
- 23. Lepidium graminifolium. L. Grasblättrige Kresse, Nastursie à feuilles de gramen. -Giugno-Ottobre. 21
- 24. Biscutella maritima. Ten Gennaio-Marzo. ①
 25. ciliata. DC. Lunetière ciliée. —
- Marzo. (1). Anacapri.

- 26. Biscutella cichoriifolia. Lois. Lunetière à feuilles de chicorée. Marzo-Maggio. (1)
- 27. laevigata. L.— β. coronopifolia (All.)
 GLATTE BRILLENSCHOTE, LUNETIÈRE LISSE. —
 Maggio-Giugno. 24
- 28. Bunias erucago. L. Keulchen Zackenschote, Masse au bedeau. Marzo. (1). Presso il mare.
- 29. Nasturtium officinale. R. Brown.—Gebräuchliche Brunnenkresse, Water cress, Cresson officinal. Marzo-Ottchre. 21. Marina di mulo.
- 30. Sinapis nigra. L. Schwarzer Senf, Wild mustard, Chou noir. Aprile-Luglio. (1)

Capparidaceae

- 1. Capparis spinosa. L.—Caper, Caprier épineux.

 Maggio-Settembre. 24
- 2. — β. rupestris (S. et Sm.) CAPER. Giugno.

Resedaceae

- 1. Reseda luteola. L.—Färber Wau, Yellow weed or Dyer's rocket, Réséda gaude.— Maggio-Giugno. (2)
- 2. alba. L. Réséda Blanc. Maggio. 24. Castiglione, Anacapri.
- 3. odorata. L. Gartenreseda, Mignonette, Réséda odorant. (1)

Cistaceae

1. Cistus salvifolius. L. — Ciste à feuilles de sage. — Aprile. 5

- 2. Cistus villosus. L. Ciste velu. Maggio-Giugno. $\stackrel{\leftarrow}{\mathcal{T}}$
- 3. monspeliensis. L.—Ciste de Montpel-LIER. — Maggio. 5. Monte Solaro.
- 4. — ß. affinis (Guss.).
- 5. Helianthemum guttatum. Mill. GETÜPFELTER SONNENGÜNSEL, SPOTTED ROCKROSE, HELIANTHÈME TACHÉ. Maggio. (1). Limbo.
- 6. B. Columnae. Presl.
- 7. Fumana. Mill.—Zwerg Sonnengünsel, Helianthème à feuilles menues. — Maggio-Giugno. 24
- 8. laevipes. Presl. Helianthème A pédoncules grêles. - Aprile-Maggio. 21
- 9. thymifolium. Pers. β . viride (Ten.). Helianthème glutineux. Aprile-Maggio. 21. Monte Solaro.
- 10. γ. glutinosum (Pers.) (H. Barrelieri Ten.)—Hélianthème Glutineux. Mulo, Anacapri.
- 11. italicum. Pers. Hélianthème D'Italie. Giugno-Luglio. 21. Monte Solaro.
- 12. vulgare. Gaert.—Gemeiner Sonnengünsel, Common Rockrose, Hélianthème commun. Maggio. 24
- 13. glaucum. Pers. β. graecum
 Boiss. et H.) (H. stabianum Ten.) Gugno-Agosto. 21. Mulo, Tiberio.

Violaceae

1. Viola odorata. L. — Wohlriechendes Veilchen, Single sweet violet, Violette odorante. — Gennaio-Marzo. 24

- 2. Viola canina. L. Hunds Veilchen, Dog's violet, Violette des chiens. Giugno. 21
- 3. silvatica. Fr. Common dog violet, Vio-LETTE des Forêts. — Marso-Aprile. 24. Trovata dalla signora Spencer.
- 4. hirta. L.—Rauhhaariges Veilchen, Hairy violet, Violet hérissée. Gennaio-Aprile. 24
- 5. — β. Denhardtii (Ten.). 24
- 6. tricolor. L.—Dreifarbiges Veilchen, Pansy or heart's ease, Pensée. Aprile. (1)
- 7. B. arvensis (Murr.) (V. gracilescens (Jord.). FIELD PANSY, PENSÉE.

Dianthaceae

- 1. Gypsophila saxifraga. L. (G. permixta Guss.)
 Steinbrech-Felsnelke, Oeillet saxifrage. —
 Aprile-Maggio. 24
- 2. Saponaria officinalis. L. Echtes Seifenkraut, Soap-wort, Saponaire officinale. Giugno. 24
- 3. Dianthus prolifer. L. Sprossende Felsnelke, Clove pink or proliferous pink, Oeillet prolifère. (1)
- 4. — β. praecox Pasq. (D. velutinus Guss.) Oeillet velouté. Marzo-Maggio.
- 5. silvestris. Wulf.—Wald-nelke, Oeil-Let sauvage. — Giugno-Agosto. 24
- 6. caryophillus. L.—β. longicaulis (Ten.)
 OEILLET GIROVLÉE. Luglio-Agosto. 24
- 7. Silene gallica. L.— (S. silvestris Schot. S. Candolli Jord.) Französisches Leimkraut, Small flowered silene, Silène de France. Maggio-Giugno. (1)

- Silene cerastoides. L. β. glabra (S. Giraldii Guss.) Aprile-Maggio. ①
- 9. italica. Pers. Hain Leimkraut, Silène d'Italie.—Maggio-Giugno. 24
- 10. cucubalus. Wib. (Silene inflata Sm. Cucubalus angustifolius Ten.) Taubenkropf, Catchfly, Silène gonflée, Cornillet.—Aprile-Maggio. 24
- 11. Lychnis dioica. L. Weisse Lichtnelke, Red or white campion, Lychnide dioique. Maggio. ①
- 12. cœli-rosa. Desv. Lychnide Rose du ciel. Aprile-Maggio. ②. Trovata dal generale Dott. Huethe.
- 13. Cerastium vulgatum. L. (C. glomeratum Thuill. C. viscosum Fries.)—Hornkraut, Mouse-ear, Chickweed, Céraiste commun. Gennaio-Marso. (2)
- 14. semidecandrum. L.—(C. arenarium Ten.). Fünfmänniges hornkraut, Little mouse-ear chickweed, Céraiste à 5 anthères. Aprile. (1)
- 15. pumilum. Curt. Céraiste grêle.

 Maggio-Giugno. (1)
- 16. glutinosum. Fr.— Céraiste gluti-
- 17. Stellaria media. Vill. Vogelmiere, Common chickweed, Stellaire intermédiaire.—Gennaio-Dicembre. 21
- 18. —

 Comunissima.

 β. apetala (Ucria). —
- 19. Arenaria tenuifolia. L. Zarter Meirich, Fine-leaved sandwort, Alsine à feuilles menues. Aprile-Agosto. 24

20. Arenaria serpyllifolia. L. — (A. sphaerocarpa Ten.) — Quendelblättriges Sandkraut, Thymelea ved sandwort, Sabline serpolet.—Marzo-Aprile. ①

21. Moehringia muscosa. L. — Moosartige Möhringie, Méringie mousse. — Maggio-Agosto. 21.

Monte Solaro.

22. — trinervia. Clair. — Dreinervige Möhringie, Méringie à trois nervures.—*Mag-gio-Giugno*. (1)

23. Sagina apetala. L. — Kronenloser Knebel, Annual-small-flowered pearlwort, Sagine sans pétales. — Maggio-Ottobre. (1). Sulle roccie.

24. — maritima. Don.—Strand Knebel, Sagine

MARITIME. — Febbraio-Maggio (1)

25. Agrostemma githago. L. — Korn Rade, Corn cokle, Agrostemme nielle. — Maggio-Agosto. Rara nei campi.

Polygalaceae

1. Polygala monspeliaca. L.—Polygal de montpellier. — Maggio-Settembre.

Portulacaceae

1. Portulaca oleracea. L. — Gemeiner Portulak, Pourpier cultivé. — Maggio-Settembre.

Paronychiaceae

- 1. Herniaria hirsuta. L.—Behaartes Tausendkorn, Turquette. — Marzo-Ottobre. (1)
- 2. β. cinerea (DC.)—HERNIAIRE CENDRÉE.

- 3. Scleranthus annuus. L. Einjähriger Knauel, Annual knawel, Gnavelle annuelle. (1)
- 4. Polycarpon tetraphyllum. L. Nagelkraut. Four-leaved all-seeds, Polycarpe à quatre feuilles. Giugno-Ottobre. (1)

Hypericaceae

- 1. Hypericum androsaemum. L.—Hypericum tutsan, Androsème officinal. — Giugno-Luglio. 2
- 2. hircinum. L. Androsème fétide. Giugno. 24
- 3. perforatum. L. Durchlöchertes Johanniskraut, St. Iohn's wort, Millepertuis perforé. Aprile-Giugno. 24
- 4. perfoliatum. L. Marzo-Luglio. 4.

 Trovato dal generale Huethe.

Malvaceae

- 1. Malva alcea. L. Spitzblättrige Käsepappel, Mauve alcée. Luglio-Agosto. 24
- 2. parviflora. Cav. Small pink mallow, Mauve à petites feuilles. Aprile. 2
- 3. silvestris. L. Wilde Käsepappel, Pink or common mallow, Mauve sauvage. Aprile. ① ②
- 4. Lavatera arborea. L. Tree mallow, Lavatère en arbre. — Febbraio-Aprile.
- cretica. L. (L. neapolitana Ten.) LAVATÈRE DE CRÈTE. — Aprile-Maggio. ②. Comunissima.
- 6. Althaea hirsuta. L. RAUHHAARIGER EIBISCH, HISPID ALTHAEA, GUIMAUVE HÉRISSÉE. — Maggio-Luglio. A Limbo. ①

4

Geraniaceae

- 1. Geranium molle. L.—Weicher Kranichschnabel, Dove's-foot geranium, Geranium mollet. Marzo-Maggio. (1)
- 2. rotundifolium. L.—Rundblättriger Kranichschnabel, Round-leaved geranium, Géranium à feuilles rondes. *Marzo*. (1)
- 3. columbinum. L. Tauben Kranichschnabel, Long-stalked geranium, Géranium pied de pigeon. — Aprile-Maggio. (1)
- 4. dissectum. L. Schlitzblätteriger Kranichschnabel, Cut-leaved geranium, Géranium découpé. Marzo-Aprile. (1)
- Robertianum. L. β. purpureum
 (Vill.). Ruprechtskraut Kranichschnabel,
 Herb Robert, Géranium Robertin.—Febbraio. (1)
- 6. Erodium cicutarium. l' Hérit.—Schierlingsblättriger Reiherschnabel, Common Erodium, Erodium à feuilles de cigne. — Febbraio. (1)
- 7. malacoides. W. Erodium fausse Mauve. Febbraio-Marzo. (1)
- 8. moschatum. l' Herit. Bisamduftender Reiherschnabel, Musk erodium, Erodium musqué. — Marzo-Maggio. (1)
- 9. Oxalis corniculata. L.—Gehörnter Sauerklee, Very small yellow sorrel, Oxalide cornue. Estate. 24
- 10. cernua. Thumb. Estate. 24
- 11. stricta. L. Steifer Sauerklee, Oxalide droite. Giugno-Settembre. 24
- 12. Linum usitatissimum. L.—Gewöhnlicher Lein, Common flax linseed, Lin commun. Marzo. (1)

- 13. Linum angustifolium. Huds. Narrow-leaved pale flax, Lin à feuilles étroites. Marzo-Maggio. 24
- tenuifolium. L. Dünnblättriger Lein,
 Lin à feuilles menues. Giugno-Luglio. 21.
 Sulle roccie.
- 15. decumbens. Desf. Aprile-Maggio. 24
- 16. gallicum. L.—Lin de France. Aprile-Luglio. ①
- 17. strictum. L.—Lin roide.—Aprile-Maggio. (1)
- 18. nodiflorum. L. Lin glanduleux. Luglio-Agosto. (1)

Rutaceae

- 1. Tribulus terrestris. L. A LOW CREEPING BUSH WITH YELLOW BLOSSOMS AND PRIKLY SEEDS, TRIBULE TERRESTRE. Giugno. (1). Tiberio.
- 2. Ruta bracteosa. D.C. Rue à grands bractées. Aprile-Giugno. 21. Monte del Telegrafo.
- 3. chalepensis. L. Rue à feuilles étroites. Maggio-Giugno. 24. Telegrafo.

COROLLIFLOREAE

Ericaceae

- 1. Arbutus unedo. L. Strawberry tree, Arbousier froisier. Ottobre-Novembre.

 †
- 2. Erica arborea. L. Bruyère arborescente. Marzo.

 †. Rara.

3. Erica multicaulis. Sal. — (E. stricta Don.). — Maggio. 5. Rara.

Oleaceae

- 1. Olea europaea. L. True olive, Olivier. Giugno. 5
- 2. Phyllirea variabilis. Timb. et Lor. β. latifolia (L.). Aprile-Maggio. 5
- 3. Ligustrum vulgare. L. Gemeiner Hartriegel, Print or prim-print, Troëne, frezillon. Maggio.

 †
- 4. Fraxinus ornus. L. Ash-tree, frêne fleuri. Aprile. †

Apocynaceae

- 1. Vinca major. L. Blue or greater periwinkle, Grande pervenche. Marzo. 21.
- 2. minor. L. Kleines Singrün, Lesser Periwinkle, Petite Pervenche. A roll: . Probabilmente sparita.
- 3. Nerium odorum. Ait. Maggio-Settembre. &

Asclepiadaceae

1. Cynanchum Vincetoxicum. Br. — Gemeine Schwalbenwurz, Dompte venin. — Maggio-Settembre. 24

Gentianaceae

- 1. Chlora perfoliata. L. Durchwachsener Bitterling, Perfoliate Yellow-wort, Chlorette perfoliée. Maggio-Novembre. ①
- 2. perfoliata. L. \u03b3. intermedia. (Ten.).

- 3. Chlora imperfoliata L. \(\beta \). acuminata (Griseb.). Chlorette \(\beta \) feuilles sessiles. Luglio. (1)
- 4. Erythraea Centaurium. Pers. Gemeines Tausendgüldenkraut, Common centaury, Petite centaurée. Giugno. (1)
- 5. forma minima.

Convolvulaceae

- 1. Convolvulus Cneorum. L. Aprile-Maggio. 24.
 Sulle rupi verso il mare, specialmente dal lato di Tragara.
- 2. siculus. L. Liseron de Sicile. Maggio. (1). Tragara.
- 3. arvensis. L.—Acker-Winde, Small Birdweed, Petit Liseron, Vrillet.—Giugno. 24
- 4. silvaticus. W. Grand Liseron. Luglio-Ottobre. 24
- tenuissimus. S. et Sm. Maggio-Luglio. 21
- 6. altheoides. L. Liseron fausse guimauve. Maggio-Luglio. 24
- 7. lineatus. L. Liseron rayé. Maggio. 24
- 8. italicus. R. et Sch. Maggio-Giugno. 24
- 9. Cuscuta Epithymum. Murr. (C. minor Bauh.).

 QUENDEL-FILZKRAUT, LESSER DODDER, CUSCUTE À
 PETITES FLEURS. Giugno. (1)
- 10. planiflora. Ten. Estate. 1

Borraginaceae

1. Cerinthe aspera. Roth. — c) gymnandra (Gasp.). Mélinet. — Aprile-Maggio. (1).

- 2. Echium plantagineum. L. Purple Echium, Vipérine à feuilles de plantain. Febbraio. (1)
- 3. pustulatum. S. et S. (E. tuberculatum. Ten.) Aprile-Giugno. (2)
- 4. calycinum. Vid. Vipérine à long calice. Aprile-Giugno. (1)
- 5. italicum. L. (E. maritimum Guss. et Cas.) Vipérine d'Italie. Luglio-Agosto. (2)
- 6. Lithospermum purpureo-cœruleum. L. Purpurblauer Steinsame, Creeping or purple gromwell, Gremil violet. Aprile. 21.
- 7. officinale. L. Gebräuchlicher Steinsame, Common gromwell, Millet d'amour, herbe aux perles. Maggio. 24.
- 8. rosmarinifolium. Ten. (L. fruticosum. S. et Sm.) Aprile-Maggio. 24. Rupe di Anacapri, Arco naturale, Castiglione.
- Myosotis arvensis. With. β. hispida (Schlecht.)
 FIELD SCORPION, MYOSOTIS HÉRISSÉ. Maggio-Ottobre. (1)
- 10. versicolor. Lk.—Verschiedenfarbiges Vergissmeinnicht, Changing myosote, Myosotis changeant. Aprile-Maggio. (1)
- 11. Borago officinalis. L.—Gebräuchliche Borage, Borage, Bourrache. Aprile-Luglio. ①
- 12. Anchusa undulata. L. Buglosse à feuilles ondulées. Gennaio. ②
- 13. hybrida. Ten. Maggio-Giugno. 2
- 14. italica. Retz. Italienische Ochsenzunge, Buglosse. — Maggio-Giugno. 24
- 15. Lycopsis variegata. L. (L. bullata Cyr.). Face de Loup. Febbraio-Aprile.
- 16. Symphytum tuberosum. L. Dickwurzelige

- Wallwurz, Tuberous-rooted comfrey, Consoude. Febbraio. 24
- 17. Cynoglossum creticum. Vill. (C. pictum Ait.).

 Cynoglosse à fleurs rayées. Maggio-Luglio. (1)
- 18. officinale. L.—β.montanum (Lam.). Gebräucliche Hundszunge, Common hound'stongue, Langue de chien.
- 19. Heliotropium europaeum. L. Europäische Sonnewende, Herbe aux verrues. Luglio. ①
- 20. Eichwaldi. Steud. (H. macro-carpum Guss.) Settembre. (1)

Solanaceae

- 1. Hyosciamus albus. L. Aprile-Agosto. (1) (2)
- 2. Solanum nigrum. L. Schwarzer nachtschatten, Common nightshade, Herbes des magiciens, mourette. Ottobre-Novembre. (1)
- 3. Datura stramonium. L. Gemeiner Stechapfel, Common thorn apple, Endormie, Herbe au diable. Luglio-Ottobre. ①. Probabilmente scomparsa.

Scrophulariaceae

- Verbascum Thapsus. L.—β. Schraderi (Mey).—
 KLEINBLÜMIGES WOLLKRAUT, GREAT MULLEIN,
 BOUILLON BLANC. Giugno. ②
- 2. sinuatum. L. Luglio. 24
- 3. Blattaria. L. β. repandum (W.) Schabenkraut, Moth mullein, Molène blattaire. Luglio-Agosto. (1)
- 4. Boerhavii. L. (v. rotundifolium

- Ten.) Molène de Boherhaave. Maggio-Giugno. (1). Monte Solaro.
- 5. Verbascum nigrum. L. Schwarzes Wollk-RAUT, DARK OR BLACK MULLEIN, MOLÈNE NOIRE, Giugno-Settembre. (2)
- 6. Scrophularia peregrina. L. Scrofulaire voyageuse. — Febbraio-Maggio. (1)
- 7. canina. L. (S. bicolor S. et S.) HUNDS BRAUNWURZ, RUE DES CHIENS. Maggio-Giugno. 4. Monte Solaro.
- 8. Digitalis lutea. L. Gelber Fingerhut, Digitale Jaune. Maggio-Agosto. 2. Selva Porciello.
- 9. Antirrhinum Orontium. L. Feld Löwenmaul, Lesser snapdragon, Tête-de-mort. — Maggio-Settembre. (1)
- 10. majus. L. Grosses Löwenmaul, Great snapdragon, Mufle de veau, muflier. Aprile-Giugno. 24
- 11. Linaria cymbalaria. Mill. (L. acutangola Ten.) Epheublättriges Leinkraut, Ivy linaria, Linare cymbalaire. Marzo-Ottobre. 24
- 12. commutata. Bernh. (L. graeca Chav.).

 Linaire grecque. Agosto-Novembre. ①. —

 Comune.
- 13. spuria. Mill.—Eiblättriges Leinkraut, Round-leaved linaria, Fausse velvote. Luglio. (1)
- 14. minor. Desf. Kleines Leinkraut, Lesser linaria, Linaire naine. Maggio. (1)
- 15. purpurea. Mill. Luglio-Ottobre. 24. var. albiflora. Rara.
- 16. chalepensis. Mill.—Linaire de Chalep. Maggio. ①. Rara.
- 17. Pelicieriana. Mill. Pelisser's Li-

- NARIA, LINAIRE DE PÉLISSIER. Maggio-Giu-gno. (1)
- 18. Linaria Elatine. Mill. Spiessblättriges Leinkraut, Pointed Linaria, Velvote vraie. — Giugno-Ottobre. 24
- 19. Veronica cymbalaria. Bod. (V. panormitana Ten. et Guss.) Véronique cymbalaire. Aprile-Dicembre. (1)
- 20. arvensis. L.—Feld Ehrenpreis, Wall speedwell, Véronique des champs. Inverno ed estate. (1)
- 21. agrestis. L.—Acker Ehrenpreis, Procumbent field speedwell, Véronique rustique. Novembre-Marso.
- 22. didyma. Ten. GLÄNZENDER EHREN-PREIS. - Novembre-Marzo. (1)
- 23. hederaefolia. L. Epheublättriger Ehrenpreis, Ivy-leaved speedwell, Véronique à feuilles de lierre. Febbraio-Marzo. (1)
- 24. Tournefortii. Gm. (V. Buxbaumii Ten. V. persica Poir.) Tournefort's Ehrenpreis, Buxbaume's speedwell. Marzo-Aprile. ①
- 25. Bartsia Trixago. L. Trixago de la Pouille.

 Maggio-Giugno. (1)
 - var. labio superiore purpureo.
- 26. latifolia. S. et Sm. Marzo. 1
- 27. Odontites serotina. Rchb. (Bartsia odontites Huds.) Rotbut tiger augentrost. Agosto-Novembre. (1)
- 28. lutea. Stev. Gelbblütiger Augentrost, Odontites jaune. Settembre-Ottobre.

Orobanchaceae

- Orobanche canescens. Presl. Aprile-Maggio. (1)
- 2. rubens. Wallr. (O. elatior Bert.). Rötliche Sommerwurz, Orobanche Rouge. — Maggio. 24
- 3. gracilis. Sm. (O. cruenta Bert.) Schlanke Sommerwurz, Orobanche couleur de sang. Maggio. 24
- 4. Spartii. Vauch. Maggio. 24
- 5. crinita. Viv. Orobanche cheve-Lue. — Aprile-Maggio. (1)
- 6. pruinosa. Lapeyr. (O. Viciae Fabae Vauch.) Maggio. 24
- 7. Kopsia cœrulea. Dum. Blaue Sommerwurz, Phélipée bleuâtre. Giugno. 24
- 8. ramosa. Dum. Ästige sommerwurz, Branched broomrape, Phélipée rameuse. — Giugno. 24.
- 9. — B. Mutelii (Schul.)

Lamiaceae

- 1. Lavandula officinalis. Chaix. (L. spica L.) Lavendel, Spike, Lavender, Aspic, Lavande femelle. Giugno. 24
- 2. Mentha macrostachya. Ten. Giugno-Settembre. 24
- 3. Pulegium. L. Polei, Penny Royal, Poulot, Herbe de Saint-Laurent. Luglio. 2.
- 4. Origanum vulgare. L. Gemeiner Dost, Wild Marjoran, Marjolaine sauvage. Agosto. 2

- Origanum virens. H. et L. Origan verdâtre. Agosto. 21.
- 6. Calamintha Acinos. Chair. Feld-Calaminthe, Field-calamint, Basil Thyme, Calament acinos. Maggio-Giugno. ①
- 7. Thymus fruticulosus. L. Maggio-Agosto.
- 8. Satureja montana. L. Savory, sadré. Luglio-Agosto. 24
- 9. Juliana. L. Maggio. 5
- 10. graeca. L. Micromérie grecque. Giugno. 💍
- 11. Melissa officinalis. L. Gebräuchliche melisse, Citronelle, Piment des abeilles. — Luglio-Settembre. 21
- calamintha. L.—(Calamintha officinalis Moench.) — Gebräuchliche Calaminthe, Calament de montagne, Baume sauvage. — Settembre-Novembre. 24
- 13. Salvia verbenaca. L. WILD SAGE, SAUGE VERVAINE. Maggio-Dicembre. 24
- 14. clandestina. L. (S. multifida Sibth.) 24
- 15. officinalis. L. Gebräuchliche salvei, Common garden sage, Sauge. Maggio-Giugno.

 †
- 16. Rosmarinus officinalis. L.—Rosemary, Roma-RIN.— Maggio-Ottobre. †
- 17. Brunella vulgaris. L. Gemeine Brunelle, Self-heal, Brunette charbonnière.—Estate. 24.
- 18. Sideritis romana. L. Crapaudine romaine. Febbraio. (1)
- 19. Stachys arvensis. L. Feldziest, Epiaire des champs. Estate. (1)
- 20. silvatica. L. Waldziest, Grande Épiaire, Ortie puante. Giugno-Ottobre. 24

- 21. Stachys recta. L. Gerader ziest, Epiaire redressée. Estate. 21.
- 22. Lamium flexuosum. Ten. Lamier flexueux Maggio. 24
- 23. amplexicaule. L.—Stengelumfassende Taubnessel, Henbit, Lamier embrassant. — Febbraio-Maggio. (1)
- 24. purpureum. L. Purpurrote Taubnessel, Red dead nettle, Lamier purpre. — Ottobre-Maggio. (1)
- 25. **Ballota nigra.** L. (B. borealis Rchb.). Schwarzer Gottesvergess, Black ballota, Marrube noir. Giugno-Settembre.
- 26. Prasium majus. L.—Prasium majeur.— Mag-gio-Agosto. †
- 27. Teucrium Scorodonia. L. Salveiblättriger Gamander, Wood sage, Germandrée sauvage. Giugno-Luglio. 24
- 28. Chamaedrys. L. Gemeiner Gamander, Wall Germander, Chenette. Giugno-Agosto. 24. Monte Solaro.
- 29. fruticans. L.—Germandrée Ligneuse. Ottobre-Marzo. 5. Tragara.
- 30. campanulatum. L. Maggio-Luglio. 24 方. A Tiberio. Rara.
- 31. montanum. L. Berg Gamander, Germandrée de montagne. Aprile. Monte Solaro.
- 32. flavum. L. Germandrée jaune. Giugno-Agosto. 💍
- 33. Ajuga reptans. L. Kriechender Günsel, Creeping bugle, Bugle. — Aprile-Maggio. 24
- 34. Iva. Schreb. Bugle musquée. Marzo-Ottobre. 24

- 35. Micromeria tenuifolia. Ten. 5
- 36. approximata. L. Estate.
- 37. Clinopodium vulgare. L. Gemeiner Wirbeldost, Roulette pied-de-lit. 24

Verbenaceae

- 1. Vitex agnus-castus. L. Agneau chaste, petit poivre. Givgno-Settembre.

 †
- 2. Verbena officinalis. L.—Gebräuchlicher Eisenhart, Common vervein, Vervein. Maggio-Agosto. 24

Acanthaceae

1. Acanthus mollis. L. — Acanthe molle. — Maggio. 24

Globulariaceae

1. Globularia eordifolia. L. — Kugelblume, Globularia. — Maggio-Agosto. 24. Monte Solaro.

Primula ceae

- 1. Primula vulgaris. Huds. Schaftloser Himmelschlüssel, Common primrose, Primevère. Febbraio-Marzo. 24. Rarissima.
- 2. Cyclamen europaeum. L. (C. hederae/olium Ten.) Alpenveilchen, Common cyclamen, Cyclame d'Europe. .Aprile. 21
- 3. repandum. S. et Sm. (C. vernum Bert.) Aprile-Maggio. 24
- 4. Lysimachia stellata. L. Maggio. ①. Monte Solaro.

- 5. Anagallis arvensis. L.—Acker Gauchheil, Red or Common scarlet pimpernel, Mouron des champs. Aprile. ①
- 6. — β. monelli (L.) (A. cœrulea All. Schreb.) Blauer Gauchheil, Blue pimpernel or Forget me not. Aprile. (1)
- 7. Samolus Valerandi. L. Salz-Bunge, Common Brook-weed, Mouron d'Eau.—Giugno-Ottobre. 21

Plumbaginaceae

- 1. Statice cumana. Ten. Giugno. 4. Sugli scogli presso il mare (Faraglioni, Limbo, ecc.).
- 2. cancellata. Bernh.—(S. pubescens Koch.) Luglio. 24
- 3. virgata. W.—(S. oleaefolia D.C. S. Smithii Ten.)—Statice rayée. Maggio-Luglio. 4

Plantaginaceae

- 1. Plantago major. L. Grosser Wegerich, Greater Plantain, Grand Plantain. Marzo. 24
- 2. lanceolata. L. Lanzettlicher Wegerich, Ribwort Plantain, Oreille de lièvre, Herbe à Scôtes. — Luglio. 24
- 3. Lagopus. L. \(\beta \). eriostachya (Ten.) —
 PLANTAIN PIED DE LIÈVRE. Maggio. 24
- 4. Bellardi. All. β. interrupta (Pasq.) PLANTAIN POILU. Maggio-Giugno. ①
- 5. Coronopus. L.—(P. commutata Guss.)

 Krähenfussartiger Wegerich, Buck's-horn

 Plantain, Pied de corbeau. Marzo. ① 24

 β. macrorhiza (Poir.)
- 6. **Psyllium.** L. Plantain à courtes Bractées. *Aprile-Maggio*. ①

CALYCIFLOREAE

Anacardiaceae

- 1. Pistacia lentiscus. L. Pistachier Lentisque. Marzo-Maggio. 5
- 2. Terebinthus. L. Pistachier téré-Binthe. — Aprile-Maggio.

 5. Scala di Anacapri.

Rhamnaceae

- 1. Evonymus europaeus. L.—Europäisches Pfaffenkäppchen, Common spindle-tree, Fusain d'Europe. Aprile. †
- 2. Rhamnus alaternus. L. Nerprun Alaterne. Maggio. 5. S. Michele, Punta Tragara.

Phaseolaceae

- - Marzo-Aprile. ①
- 2. Termis. Forsk. Aprile. ①
- 3. Ononis viscosa. L. Bugrane visquuse. Aprile-Giugno. ①
- 4. reclinata. L. Aprile-Agosto. 1
- 5. — β. minor (Moris) (O. mollis Savi.) Small ononis, Ononis renversée. Aprile. ①
- 6. Columnae. All. Bugrane de Columna Magaio-Agosto. 24

- 7. Ononis ornithopodioides. L. Bugrane PIED D'OISEAU. Aprile-Maggio. (1)
- 8. Sieberi. Boss. Aprile-Maggio. ②
- 9. Spartium junceum. L. Esparto grass, Spartium à branche de jonc. Aprile. 🕏
- 10. Ulex europaeus. L. Stechginster, Furze, Gorse, Whin, Ajonc d'Europe. Maggio. 5
- 12. villosa. Link. (Cytisus laniger D.C.) Calycotome velue. Aprile. \pm
- 13. Cytisus Laburnum. L. Goldregen, Cytise. Maggio. 💍
- 14. ramosissimus. Ten.—(C. apulus Ten.) 5
- 15. triflorus.l'Hér.-Cytise à troisfleurs. 5
- 16. hirsutus. L. Cytise Hérissé. Maggio-Giugno. †
- 17. Anthyllis Barba-Jovis. L.—Anthyllide Barbe-DE-Jupiter. — Aprile-Giugno. 💍
- 18. vulneraria. L. (Vulneraria heterophylla Moench.) Wundklee, Lady's-finger, Anthyllide vulneraire. Aprile-Maggio. 24.
 β. rubra (Gou.) Monte Solaro, Telegrafo.
- 19. tetraphylla. I.. Anthyllide à Quatre folioles. Aprile-Maggio. (1)
- 20. Hymenocarpus circinnatus. Savi. (Medicago circinnata L.)—Нұме́мосаре воисье́в.—Aprile-Maggio. (1). Di problematica esistenza.
- 21. Medicago lupulina. L. Hopfenklee, Black Medick, Luzerne Houblon. Maggio-Giugno. (1) 24.
- 22. tuberculata. Willd. Luzerne tu-BERCULEUSE. — Estate. (1)

- 23. Medicago lappacea. Desr. (M. flexuosa Ten.)
 Luzerne Bardone. Maggio-Agosto. ①
- 24. litoralis. Rohde β. longiseta D. C. (M. arenaria Ten.) Luzerne des rivages. ①
- 25. minima. Desr. β. caprensis, Pasq. Aprile-Maggio. ①. Rarissima nell' isola e probabilmente scomparsa. (v. descrizione in principio).
- 26. orbicularis. All. Luzerne orbicu-
- 27. muricoleptis. Ten. Maggio-Giugno. (1)
- 27 bis arborea. L. Di rupi al disotto del Castello. Aprile.
- 28. arabica. L.—(M.maculata W.)—Arabischer Schneckenklee, Yellow trefoil, Luzerne tachêe. Maggio. (1)
- 29. rigidula. Lam. a. agrestis (Ten.) (M. Gerardii Kit.) Steifer schneckenklee. Maggio-Luglio. (1)
- 30. Murex. W. b. sphaerocarpa (Bert.). Luzerne Herissée. — Estate. (1)
- 31. tribuloides. Desr. a. truncatula (Gaert.) Luzerne faux tribule. Aprile-Maggio. (1)
- 32. praecox. D. C. Marzo-Aprile. 1
- 33. Melilotus italica. Lam. (M. rotundifolia Ten.)

 Melilot d'Italie. Marzo-Maggio. 1
- 34. indica. All. (M. parviflora Desf.) Aprile. (1)
- 35. infesta. Guss. Marzo-Maggio.
- 36. neapolitana. Ten. (M. gracilis D.C.)

 Maggio. (1)
- 37. sulcata. Desf. Melilot sillonné. Aprile-Maggio. ①

5

- 38. Trifolium repens. J. Weiss-klee, White or Dutch clover, Trèfle rampant. Aprile-Ottobre. 21
- 39. suffocatum. L.—Suffocated clover,
 Trèfle étouffé. Marzo. ①
- 40. angustifolium. L. Trèfle à feuilles étroites. — Maggio. (1)
- 41. incarnatum. L. Incarnat Klee, Crimson Clover, Tréfle incarnat. — Maggio-Giugno. (1)
- 42. arvense. L. Acker Klee, Hure'sfoot clover, Trèfle des champs. — Aprile-Maggio. ①
- 43. ligusticum. Balb. Maggio-Luglio. (1)
- 44. scabrum. L. Rauher Klee, Rough clover, Trèfle raboteux. Aprile. (1)
- 45. Bocconei. Savi. Boccone's clover, Trèfle de Boccone. Aprile-Luglio. ①
- 46. stellatum. L.—Starry clover, Trèfle étoilé. Aprile. ①
- 47. pratense. L. (*T. expansioum* W. et K.) Wiesen Klee, Red clover, Trèfle des prés. *Maggio-Settembre*. 21
- 48. lappaceum. L. Maggio-Giugno.
- 49. Cherleri. L. Trèfle de Cherler. Maggio-Giugno. (1)
- 50. resupinatum. L.—Reversed clover, Trèfle renversé. — Aprile-Luglio. (1)
- 51. tomentosum. L. Aprile. 1
- 52. subterraneum. L. Subterranean clover, Trèfle souterrain. Aprile. (1)
- 53. procumbens. L. Liegender klee, Hop clover, Trèfle étalé. Maggio. (1)

- 54. Trifolium agrarium L. Gold-Klee, Trefle des champagnes. Maggio. (1)
- 55. brutium. Ten. (T. mesogitanum Bois.) Luglio. (1)
- 56. Lotus edulis. L. Lotier comestible. Marzo-Maggio. (1)
- 57. ornithopodioides. L. Lotier pied d'oiseau. Maggio-Luglio. (1)
- 58. cytisoides. L. Lotier faux-cytise. Aprile-Luglic.
- 59. angustissimus. L. (L. Levieri Hedr.). SLENDER LOTUS, LOTIER ETROITE. Aprile. (1)
- 60. uliginosus. Schk.—Sumpf-Hornklee, Bird's foot trefoil, Lotier des marais. Giugno-Luglio. 24
- 61. Dorycnium hirsutum. Ser.—Maggio-Giugno. 24
- 62. parviflorum. D. C. (D. rectum Ser.) Maggio. 5
- 63. Tetragonolobus purpureus. Moench. (Lotus tetragonolobus I..) Tétragonolobe Rouge. Estate. (1)
- 64. Colutea arborescens. L. Baumartiger Blasenstrauch, Baguenaudier arbuste. Maggio. 5
- 65. Psoralea bituminosa. L. (P. plumosa Rchb.)
 Psoralier bitumeux. Luglio-Agosto. 24.
- 66. Astragalus hamosus. L. Astragale en hameçon. Marzo-Maggio. ①
- 67. Cicer. L.—Kicherartige Bärenschote, Astragale pois chiche. — Giugno-Luglio. 24
- 68. glycyphyllos. L. Süsse Bärenschote, Milkvetch, Astragale réglisse. Maggio-Agosto. 4. Raro.
- 69. sesameus. L. Astragale sésame. Maggio. ①

- 70. Coronilla Emerus. L. Strauchige Kronwicke, Coronille des Jardins. Marzo. 5
- 71. scorpioides. Koch. Coronille queue de scorpion. Aprile. ①
- 72. Valentina. L. Coronille à grandes stipules. Febbraio-Marzo. 5
- 73. Ornithopus compressus. L. (Scorpioides leguminosa Dalech.) Ornithope comprimé. Maggio. (1)
- 74. Onobrychis Caput-galli. Lam. Esparcette tête-de-coo. Aprile. (1)
- 75. Hippocrepis unisiliquosa. L. Hippocrépide à une gousse. Aprile-Luglio. (1)
- 76. ciliata. W. HIPPOCRÉPIDE CILIÉE. Aprile-Maggio. (1)
- 77. Cicer arietinum. L. Chick Pea, Chiche tête-De-Bélier. — Giugno-Luglio. (1)
- 78. Vicia Gerardi. Vill. Maggio-Luglio. 21.
- 79. pseudo-cracca. Bert.—Vesce des rivages.

 Marzo-Aprile. (1)
- 80. varia. Host. (V. dasycarpa Ten. V. platycarpa Pasq.) Vesce variable. Maggio-Luglio. (1)
- 81. ochroleuca. Ten. Aprile. 24
- 82. hybrida. L. Vesce Hybride. Aprile. 1
- 83. leucantha. Biv. (Eroum agrigentium Guss.) Marzo-Maggio.
- 84. Faba. L. (Faba vulgaris D. C.) Buff-Wicke, Garden bean, Fève. Febbraio.
- 85. narbonensis. L. Vesce de narbonne. Aprile-Maggio. ①
- 86. angustifolia. All. Vesce à feuilles étroites. Maggio-Giugno. (1)
- 87. spuria. Raf. Marzo-Aprile. 1

- 88. Vicia sativa. L. Futter Wicke, Common vetch, Vesce cultivée. Maggio-Giugno. (1)
- 89. bithynica. L. BITHYNIAN VETCH, VESCE DE BECSARGIL. Maggio-Giugno. (1)
- 90. gracilis. Lois. Schlanke Erve, Vesce grêle. Maggio-Giugno. (1)
- 91. Ervum tetraspermum. L.—Viersamige Erve, Slender vetch, Ers à quatre graines. Aprile-Luglio.
- 92. hirsutum. Koch.—Zitterlinse, Hairy vetch, Ers hérissée. Maggio-Giugno. ①
- 93. longifolium. Ten. Maggio-Luglio.
- 94. monanthum. Ten. (Vicia monanthos Desf.) EINBLÜTIGE ERVE, ERS À UNE FLEUR. Aprile. Maggio. (1)
- 95. Lens. L. Essbare Linse, Lentille commune. Giugno-Agosto. (1)
- 96. Pisum sativum. L. Schoten-Erbse, Garden Pea, Pois cultivé. Maggio-Giugno. (1)
- 97. Lathyrus Aphaca. L. RANKEN PLATTERBSE, YELLOW VETCHLING, GESSE SANS FEUILLES. Aprile. (1)
- 98. sativus L. Essbare Platterbse, Gesse cultivée. Maggio. (1)
- 99. alatus. Ten. Maggio. (1)
- 100. Clymenum. Ten. (L. tenuifolius Desf.) Gesse clymene. Maggio-Giugno. ①
- 101. Cicera. L. (L. dubius Ten.) Gesse chiche. Maggio. ①
- 102. variegatus.Godr.—Maggio-Giugno.24
- 103. Ceratonia siliqua. L.—Carob-tree, Caroubier. Ottobre-Novembre. Scala di Anacapri. Rara.
- 104. Scorpiurus subvillosa. L. Scorpiure VELU. Maggio-Giugno. ①

105. Orobus vernus. L. — Frühlings Platterbse, Orobe printanier. 24

Rosaceae

- 1. Prunus insititia. L. Haferschlehe, Prunier sauvage. Marzo-Aprile. 🕇
- 2. Rubus discolor. W. et N. (R. dalmaticus Tratt.). Verschiedenfarbige Brombeere, Blackberry, Ronce. Giugno. 💍
- 3. Potentilla reptans. L. Kriechender Gänserich, Common creeping cinquefoil, Potentille rampante. — Maggio. 24
- 4. Fragaria vesca. L. Gemeine Erdbeere, Wood strawberry, Fraisier de table. Aprile. 24
- 5. elatior. Ehrh. Garden strawberry, Fraisier élevé. Giugno-Settembre. 21.
- 6. Agrimonia Eupatoria. L. Gemeiner Odermenning, Common agrimony, Aigremoine eupatoire. *Maggio*. 24
- 7. Alchemilla arvensis. Scop. (A. aphanes Ten.) Feld-sinau, Field ladies mantle, Percepierre des champs. Aprile-Luglio. 24
- 8. Rosa sempervirens. L. Rosier toujours vert. Aprile-Giugno. 5
- rubiginosa. L. β. agrestis (Savi.). –
 Weinrose, Sweetbriar, Rosier rouillé. Maggio-Giugno.
 - — γ. micrantha (Sm.). Kleinblütige Rose. Giugno. 5. Anacapri.
- 10. Poterium sanguisorba. L. Wiesenknopf, Salad Burnet, Petite pimprenelle. Maggio-Ottobre. 24
- 11. muricatum. Spach. (P. polygamum

- W. et K. Sanguisorba minor Bert.) Kleiner Wiesenknopf. Maggio-Giugno. 21
- 12. Crataegus oxyacantha. L. Gemeiner Weissdorn, Whitethorn, Aubépine commune. — Marzo.

 †
 - β. monogina Jacq. Eingriffeliger Weissdorn, Aubépine a une grain.
- 13. Mespilus germanica. I.. Deutsche Weissdorn, Common medlar, Neflier d'Allemagne. Maggio-Giugno. (1)

Epilobiaceae

1. Circaea Lutetiana. L. — Gemeines Hexenkraut, Common enchanter's nightshade, Circée. — Giugno-Agosto. 24

Myrtaceae

- - minata Pasq.). Anacapri. Certosa.
- 2. Punica Granatum. L. Grenadier. Luglio. 5

Crassulaceae

- 1. Cotyledon umbilicus. L. (Umbilicus pendulinus D.C.) Common navelwort. Maggio. 24
- 2. horizontalis. L. Maggio. 24
 - 3. Sedum stellatum. L. (Sempervivum tertium Col.) Orpin Étoilé. Aprile-Maggio. ①

- 4. Sedum rubens. L. Alpen Fetthenne, Crassule Rougeatre. Maggio-Giugno. (1)
- 5. litoreum. Guss. Aprile-Maggio. 1
- 6. Cepaea. L. RISPIGE FETTHENNE, ORPIN FAUX OIGNON. Luglio. ①. Trovato dal generale Huethe.
- 7. altissimum. Poir. (S. rufescens Ten.) Orpin élevé. — Maggio-Giugno. 24
- 8. dasyphyllum. L. Bereifte Fetthenne, Thick-leaved white stonecrop, Orpin à feuilles étroites. — Maggio-Giugno, 21

Mesembryanthemaceae

1. Mesembryanthemum nodiflorum. L. — Ice Plant, Ficoïde nodiflore. — Maggio-Giugno. ①. Selva di Porciello.

Cactaceae

- 1. Opuntia Ficus-Indica. Mill. (O. vulgaris Ten.)
 PRIKLY PEAR, OPONCE, FIGUES D'INDE.—Maggio. 5
- 2. amyclaea. Ten. Maggio. 💍

Saxifragaceae

1. Saxifraga tridactylites. L. — Dreifingeriger Steinbrech, Rue-leaved saxifrage, Saxifrage des murailles. — Febbraio-Marzo. (1)

Apia ceae

1. Eryngium maritimum. L. — Meerstrands-männertreu, Sea holly, Panicaut maritime. — Maggio-Luglio. 24

- 2. Sanicula europaea. L. Europäischer Sanikel, Wood sanicle, Sanicle commune. Aprile. 24
- 3. Smyrnium olusatrum. L. Common Alexanders, Maceron potager. Marzo-Aprile. ②
- 4. Bupleurum Odontites. L. (B. aristatum Bart.)

 NARROW BUPLEVER, BUPLÈVRE ARISTÉ. Giugno. (1). Anacapri.
- 5. subovatum. Link. (B. protractum Hoff. et Link.) Buplèvre allongé. Maggio. (1). Anacapri.
- 6. Apium petroselinum. L. (Petroselinum sativum Hoffm.). — Gemeine Petersilie, Persil cultivé. — Estate. (2)
- 7. Ammi majus. L. Grosses Ammi, Ammi elevé. Giugno-Settembre. (1)
- 8. Pimpinella magna. L. Grosse Bibernelle, Greater pimpernel, Roucage à grandes feuilles. Luglio-Agosto. 24
- 9. Scandix Pecten-Veneris. L. Kammförmiger Nadelkerbel, Venus' comb, Aiguillette. Marzo. (1)
- 10. Tragium Columnae. Spreng. (Pimpinella Tragium Vill.) Giugno-Agosto. 21.
- 11. Seseli montanum. L. β. polyphyllum (Ten.) Agosto-Ottobre. 24
- 12. Foeniculum capillaceum. Gilib. Gebräuchlicher Fenchel, Common fennel, Fenouil. Luglio-Agosto. 24
- 13. Crithmum maritimum. L. Sea samphire, Crithmum maritime. Luglio-Agosto. 21
- 14. Oenanthe chaerophylloides. L. Maggio-Giugno. 24.
- 15. Bifora testiculata. Rchb. (B. flosculosa Bieb.)

 Aprile. ①

- 16. Daucus Carota. L. (D. foliosus Guss. D. gibbosus Bert.) Gemeine Möhre, Wild carrot, Carotte. Maggio-Dicembre. ②

 — — — — — (Lam.) (D. nitidus Gasp.) Carotte maritime.
- 17. bicolor. S. et Sm. (D. setulosus Guss.)
 Giugno-Luglio. (1)
- 18. Gingidium. L. CAROTTE CERFEUIL. —
 Giugno-Agosto. (1)
- 19. Michelii. Car. (D. Broteri Ten.). ①
- 20. Thapsia Asclepium. L. Maggio-Giugno. 24
- 21. Caucalis nodosa. B. et H. Knatenfrüchtiger Klettenkerbel, Knotted caucalis, Caucalide noueuse. *Marzo-Aprile*. ①. Via della Marina Grande; trovata dal generale Huethe.

Araliaceae

1. Hedera helix. I.. — Gemeiner Epheu, Common ivy, Lierre commun. — Settembre-Ottobre. 5

Cornaceae

1. Cornus sanguinea. L. — Rote Cornelle, Wild cornel-tree, Cornuller femelle. — Aprile-Maggio. 7

Rubiaceae

- 1. Sherardia arvensis. L. Acker Sherardie, Little field madder, Sherarde des champs. — Maggio. ①
- 2. Asperula tomentosa. Ten. Giugno. 21. Scala di Anacapri e rupi della Grotta azzurra.

- 3. Asperula arvensis. L. Acker Meier, Aspérule des champs. Maggio-Giugno. (1)
- 4. Rubia peregrina. L. WILD MADDER, GARENCE VOYAGEUSE. Maggio. 24
 - β. angustifolia (L.) –
 GARANCE À FEUILLES ÉTROITES. Monte Solaro.
- 5. Bocconi. Pet. Maggio-Agosto.
- 6. Galium lucidum. All.—(G. corrudaefolium Vill.)

 Maggio. 24.
- 7. Vaillantia. Web. (G. saccharatum All.) ÜBERZUCKERTES LABKRAUT, GRATTERON DE VAIL-LANT. — Maggio. ①
- 8. tricorne. Vith. Dreihörniges Labkraut, Three flowered goose grass, Gaillet à trois cornes. — Aprile-Maggio. (1)
- 9. Cruciata. Scop. Kreuz-Labkraut, Cross-wort bed-straw, Gaillet croisette. Marzo. (1)
- 10. Aparine. L. Kletterndes Labkraut, Goose-grass, Cleavers, Gratteron, Rieble. Aprile-Settembre. (1)
- 11. murale. All. Gaillet des murs. Marzo. (1)
- 12. Vaillantia muralis. L. Vaillantie des murs. Marzo-Maggio. ①

Campanulaceae

- 1. Specularia speculum. D.C. fil. Echter Frauenspiegel, Spéculaire miroir de Vénus. Aprile-Giugno.

 - (S. cordata Vis.) Aprile. (1)
- 2. hybrida. D. C. fil. Unechter Frauenspiegel, Spéculaire hybride. — Maggio ①

- 3. Specularia falcata. D.C. fil. Spéculaire en Faux. Maggio. ①
- 4. Campanula fragilis. Cyr. (C. diffusa Vahl.). Giugno. 21. In cespugli sulle roccie, specialmente al nord dell' isola.
- 5. Erinus. L. Campanule érine. Aprile. (1)
- 6. Rapunculus. L. Rapunzel Glockenblume, Rampion, Campanule Raiponce. Giugno. 24
- 7. Trachelium cœruleum. L. Campanule Gantelée. 24. Trovato dal generale Huethe.

Cucurbitaceae

- 1. Bryonia dioica. Jacq. Rotbeerige Zaunrübe, Common briony, Bryone. 21
- 2. Echallion Elaterium. Rich. Echallie elastique. Aprile-Settembre. 24

Loniceraceae

- 1. Sambucus nigra. L. Schwarzer Holunder, Elder tree, Sureau noir. Maggio- Giugno. 5
- 2. Lonicera implexa. Ait. Chévrefeuille des Baléares. Maggio-Giugno. 5

Valerianaceae

- Fedia cornucopiae. Gaertn. Fédia corne d'abondance. — Maggio.
- 2. Valeriana eriocarpa. Desv. Borstiges Ra-

PÜNZCHEN, MÂCHE À FRUIT VELU. — Aprile-Mag-

gio. ①

4.

3. Centranthus ruber. D.C. — Rote Baldrian, Red Valerian, Centranthe des Jardins, Barbe de Jupiter. — Aprile-Maggio. 21. 5

varietà albiflora.

4. — Calcitrapa. Dufr. — Centranthe chausse-trape. — Maggio. 24

Dipsaceae

1. Scabiosa grandistora. Scop. — (S. maritima Ber. S. ambigua Ten.) — Giugno-Dicembre. 24

2. — crenata. Cyr. — Maggio-Ottobre. 4.

Sulle rupi dell'Arco naturale.

3. — Columbaria. L. — (S. integrifolia Savi)
Tauben Skabiose, Small scabious, Scabieuse
colombaire. — Giugno. 24

- gramontia. L. - β. Columnae (Ten.).

Giuano, Agosto, 21. Rarissima.

5. — cretica. L. — β. heterophylla (Pasq.) (S. himettia Boiss.) — MaggioGiugno. 5. Estremamente rara nell'isola, dove fu a prima rinvenuta dal prof. Pedicino presso Tiberio (Settembre 1864).

Asteraceae

- 1. Tussilago Farfara. L. Gemeiner Huflatich, Colts foot, Tussilage pas-d'âne. — Marzo-Aprile. 24
- 2. Solidago Virga-aurea. L. Gemeine Goldrute, Common Goldenrod, Herbe des juifs. Agosto-Ottobre. 24
- 3. Erigeron canadensis. L. Kanadische Dürr-

wurz, Canadian erigeron, Vergerette du Canada. — Agosto. (1)

4. Frigeron linifolius. W. - Giugno-Settembre. 1

- 5. Bellis perennis. L. Ausdauernde massliebe, Common daisy, Paquerette, Marguerite. — Gennaio-Novembre. 24
- 6. annua. L. Pâquerette annuelle. Febbraio. (1)
- 7. Cineraria maritima. L. (Senecio cineraria D.C. Cineraria cerathophylla Ten.) Seneçon cinéraire. Giugno-Luglio. 24
- 8. Senecio vulgaris. L. Kreuzkraut, Groundsel, Seneçon, toute venue. Gennaio-Dicembre. (1)
- 9. Chrysanthemum segetum. L. Saat Wucher-Blume, Corn Marigold, Chrysanthème des blés. Febbraio-Marzo. (1)
- 10. coronarium. L. Gekrönte Wucherblume, Chrysanthème couronnée. — Aprile-Maggio. (1)
- 11. hybridum. Guss. Febbraio-A-
- 12. Myconis. L. Chrysanthème de Mycon. Maggio. (1)
- 13. Matricaria Chamomilla. L. Echte Kamille, Wild Chamomile, Matrica!re camomille. Aprile.-Luglio. (1)
- 14. Anthemis arvensis. L. Acker Hundskamille, Corn Chamomile, Oeil de Vache. Maggio-Settembre. (1)
- 15. mixta. L. Camomille mixte. Maggio. (1)

- 17. Achillea ligustica. All. Achillée à feuilles de livèche. Estate. 24
- 18. Artemisia arborescens. L. Armoise en arbre. Maggio-Giugno. 🕇
- 19. Xanthium spinosum. L.—Dornige Spitzklette, Lampourde épineuse. — Agosto-Settembre. (1)
- 20. strumarium. L. Gemeine Spitzklette, Herbe aux écrouelle. — Agosto. (1)
- 21. Inula Conyza. D.C. (Conyza Squarrosa L.) Sparriger alaut, Ploughman's spikenard, Inule conyze. Giugno-Agosto. ②
- 22. viscosa. Ait. Cupulaire visqueuse. Settembre. 21.
- 23. graveolens. Desf. Cupulaire fétide. Settembre. 24
- 24. Asteriscus spinosus. Gr. et Godr. Pallénis Épineux. Giugno-Settembre. (2)
- 25. Calendula arvensis. L. Acker Ringelblume, Marigold, Petit souci. Tutto l'anno. (1)
- 26. Phagnalon rupestre. D.C. (P. Tenorii Pr.). Febbraio-Maggio. 24
- 27. Helichrysum litoreum. Guss. Maggio-Giugno. 24
- 28. Filago germanica. L. Deutsches Schimmelkraut, Cudweed, Cotonnière d'Allemagne. — Maggio. ①
- 29. Evax pygmaea. Pers: Evax pygmée. Aprile-Giugno. ①
- 30. Carlina vulgaris. L.—Gemeine Eberwurz, Common carline, Carline commune. Agosto-Settembre ②
- 31. involucrata. Desf. (C. corymbosa Ten.) Carline en corymbe. Luglio-Agosto. $\stackrel{\leftarrow}{\rightarrow}$

- 32. Carlina lanata. L. Carline Laineuse. Luglio. (1). Trovata dal sig. Burnett. (1)
- 33. sicula. Ten. Luglio. Trovata dal sig. Jervis. (2)
- 34. Crupina vulgaris. Cass. (Crupina Crupina-strum Moris.) Chondrille commune. Giugno. (1)
- 35. Centaurea cineraria. L. Maggio-Giugno. 2
- 36. cinerea. Lam. Aprile-Maggio. 2
- 37. solstitialis. L. Sonnewende Flockenblume, Jellow centaurea, Centaurée du solstice. Giugno. ①
- 38. Carthamus lanatus. L. Chardon béni des Parisiens. Luglio. (1)

(C. peregrinus Ten.).

- 40. Cynara cardunculus. L. Cardon. Maggio-Giugno. 24
- 41. Onopordon tauricum. W. (O. virense D.C.) Onopordon verdâtre. Giugno-Luglio. ②
- 42. illyricum. L. Onopordon d'Illy-RIE. — Luglio-Agosto. (2)
- 43. Galactites tomentosa. Moench. (Centaurea galactites L.)—GALACTITE COTONNEUSE. Maggio. (1)
- 44. Scolymus hispanicus. L. Epine Jaune. Luglio-Settembre. (2). Mulo ed Anacapri.
- 45. grandiflorus. Desf. Scolyme à GRANDES FLEURS. Giugno. 24

⁽¹⁾ v. MIGLIORATO E. — Osservazioni relative alla flora napoletana — Ball. Soc. Bot. 1t. — Giugno 1896, p. 168.

⁽²⁾ V. MIGLIORATO E. l. c.

- 46. Rhagadiolus stellatus. W. (R. edulis Gaertn. R. intermedius Ten.) Rhagadiole étoilé. Marzo. (1)
- 47. Hyoseris scabra. L. Hyoséride Rude. Mar-zo-Maggio. ①
- 48. lucida. L. Settembre-Marzo. 24
- 49. Hedypnois cretica. W. Aprile. ①
 β. rhagadioloides (Sibth.)
 (H. tubaeformis Ten.).
- 50. Cichorium Intybus. L. Gemeine Wegwarte, Succory or chicory, Chicorée sauvage. Luglio-Novembre. 24
- 51. Hypochaeris glabra. L.—Kahles Ferkelkraut, Glabrous hypochaere, Porcelle glabre. Maggio. ①
 - β. minima (Cyr.) (H. aracnoidea Bid.) PORCELLE GLABRE.
- 52. neapolitana. D.C.—(H. dimorpha Ten.) HERBE À L'ÉPERVIER. Maggio-Giugno. 21
- 53. aetnensis. B. et H. Marzo-Maggio. (1)
- 54. Thrincia tuberosa. D.C. THRINCIE TUBÉREUSE. Agosto-Settembre. 24
- Leontodon saxatilis. Rchb. (L. crispus Will.)
 LIONDENT CRÉPU. Maggio-Agosto. 24. Comunissima.
- 56. Picris hieracioides. L. Habichtskrautähnlicher Bitterich, Hawkweed picris, Picride épervière. Giugno-Ottobre. ②
- 57. Urospermum Dalechampii. Desf. Urosperme De Dalechamp. Maggio-Giugno. 24
- 58. picroides. Desf. Urosperme Fausse picride. Marzo-Maggio. ①

- Scorzonera Columnae. Guss. Aprile-Maggio.
 Rarissima a Tiberio.
- 60. Tragopogon pratensis. L. Wiesen Haferwurz, Meadow salsify, Barbe de Bouc-Ratabout. — Maggio Giugno. (2)
 - 61. porrifolus. 1.. Lauchblättrige, Haferwurz, Salsifis. Maggio-Giugno. (2)
 - 62. Helminthia echioides. Gaertn. Natterkopfartiges Wurmkraut, Ox-tongue, Helminthie vipérine. — Aprile-Agosto. (1)
 - 63. Chondrilla juncea. L. BINSENARTIGER KRÜM-LING, CHONDRILLE EFFILÉE. — Giugno-Settembre. (2)
 - 64. Lapsana communis. L. Gemeine Milche, Nipplewort, Herbe aux mamelles, Graveline. Maggio. (1)
 - 65. Lactuca muralis. Fres. Mauer Lattich, Wall Lettuce, Laitue des murs. Maggio. (1)
 - 66. saligna. L. WILLOW LETTUCE, LAITUE À FEUILLES DE SAULE. Luglio-Agosto. (2)
 - 67. Sonchus asper. Bart. RAUHE-SAU, LAITRON RUDE. Maggio-Ottobre. (1)
 - 68. oleraceus. L. Kohlartige Sau, Common sowthistle, Liarge, Palais de lièvre. Maggio-Ottobre. (1)
 - 69. tenerrimus. L. (S. pectinatus D. C.)

 LAITRON DÉLICAT. Giugno-Luglio. 24
 - 70. Picridium vulgare. Desf. Picridie commune. Maggio-Ottobre. 24
 - 71. Taraxacum vulgare. Lam. (T. leontodon Dum.) Pissenlit officinal. Marzo-Ottobre. 24
 - 72. Zacintha verrucosa. Gaertn. Zacinthe à verrues. Giugno-Luglio. ①. A Limbo.

- 73. Crepis bulbosa. Cass. Crépide Bulbeuse. Marzo. 24.
- 74. leontodontoides. All. (Barchausia tenerrima Ten. Lagoseris taraxoides Reich.). CRÉPIDE VERDÂTRE. Maggio. ①
- 75. neglecta. L. (C. cernua Ten.) Aprile-Maggio. (1)
- 76. Hieracium crinitum. S. et Sm. Settembre. 24
- 77. praealtum. Vill. Hohes Habichtskraut, Epervière élancée. — Maggio. 21
- 78. Andryala sinuata. L. β . dentata (S. et Sm.) Giugno. (1)

INDICE

Acanthaceae P	. 61	Amaryllidaceae P. 32
Acanthus mollis. L	ivi	Ammi majus. L » 73
Aceras antropophora. Br. » Achillea ligustica. All. »	79	Anacardiaceae » 63
Adjortum Canillus-Vene-		Aa. 11: namusanaia T 86
ris. L »	22	Anchusa hybrida. Ten » 54
ris. L	23	— italica. Retz » ivi
Agrimonia Eupatoria. L. »	70	Andropogon hirtum, L » 28
Agrostemma gitnago. L. »	40	- β, pubescens
Agrostis vulgaris. With. » Aira capillaris. Host »	27	(Vis.) » ivi
Aira capillaris. Host »	28	Andryala sinuata. L » 83
Ajuga Iva. Schreb »	60	Anemone apennina. L » 40
— reptans. L »	ivi	- coronaria. L » ivi
Alchemilla arvensis. Scop. »	70	- hortensis, L » iv
Allium Ampeloprasum.L. »	31	Anthemis arvensis. L > 78
- Chamaemoly. L »	ivi	- Cotula L » iv
- flavum. L »	ivi	- mixta. I » iv
- magicum. L »	ivi 🔻	Anthoxanthum odora-
— multiflorum. Dest. x	171	tum. L
- paniculatum. L. x	ivi 🔻	Anthyllis Barba-Jovis. L. » 64
- roseum. L x	ivi 🔻	_ tetraphylla viv
- subhirsutum. L. »		– vulneraria. L. » iv
- triquetrum. L x	ivi	Antirrhinum majus. L. » 56
- vineale. L »	ivi 🔻	— Orontium.
Alnus cordifolia. Ten »		L ivi
Aloe vulgaris. Lam »	31	
Alopecuros utriculatus.		Apiaceae » 72
Pers »	26	Apium petroselinum. L. » 73
Althaea hirsuta. L »	49	
Alyssum maritimum.Lam. »		1 1
Amarantaceae	38	Arabis collina. Ten » 42
Amarantus Blitum. L x	ivi	— perfoliata. Lam. » ivi
- deflexus. L ×	ivi	 perfoliata. Lam. » ivi verna. R. Brown. » ivi
- retroflexus. L. »		
- viridis. L »		

Araliaceae P. 74	Biscutella laevigata. L. P. 44
Arbutus Unedo. L » 51	
Arenaria serpyllif lia. L. » 48 — tenuifolia. L » 47	Borraginaceae » 53
Arisarum proboscideum.	Borrago officinalis. L » 54
Savi	Brachypodium distachyon.
— vulgare. Rchb. » ivi	R. et S 24
Artemisia arborescens. L. > 79	
Arum italicum. Mill » 29 Arundo Donax. L » 27	— linnatum. PB » ivi
	PB
Asclepiadaceae » 52	R. et S » ivi
Asparagaceae » 30	Brassica campestris. L. > 43
Asparagus acutifolius. L. » ivi	- fruticulosa.Cyr. » 42
Asperula arvensis. L » 75	— incana. Ten » 43
— tomentosa. Ten. » 74	Brassicaceae * 42
Asphodelus fistulosus. L. » 31	
- ramosus. Gou. » 31 Asplenium Adianthum-	— minor. L » ivi
niorum. L. 99	Bromus erectus, Huds > 25
- Trichomanes.	— matritensis. L » 24
L vivi	— maximus. Desf. » ivi
Asteraceae » 77	— matritensis. L » 24 — maximus. Desf. » ivi — sterilis. L » ivi — tectorum. L » 25
Asteriscus spinosus. Gr.	Brunella vulgaris. L » 59
et Godr	Bryonia dioica. Jacq » 76
et Godr	Bunias erucago. L * 44
— glycyphyllos.	Bupleurum Odontites. L. » 73
L » ivi	— subovatum. Link » ivi
hamosus. L. » ivisesameus. L. » ivi	
Atriplex angustifolia. L. > 38	Cactaceae » 72
Avena barbata. Brot » 27	Cakile maritima. Scop. » 43
— sterilis. L » ivi	Calamintha Acinos.
Ballota nigra. L * 60	Chair
Bartsia latifolia. S. et Sm. » 57 — Trixago. L » ivi	Calendula al vensis. D 79
Bellevallia romana, Rohh. > 30	CALICIFLOREAE » 03
Bellis annua. L 78	Calycotome spinosa. Link. » 64
— perennis. L » ivi	- villosa. Link. » ivi
Betulaceae » 35	Campanula Erinus. L » 76
Bifora testiculata. Rchb. » 73	- fracilia Cvr vivi
Biscutella cichoriifolia.	- Kapunculus.
Lois	ш » 1V1
— ciliata. D. C. » 43	Campanulaceae » 75

Capparidaceae P. 44	Chlora perfoliata. L. B.
C	intermedia. (Ten.) .P. 5
Capparis spinosa. L » iv.	'[Chondrilla juncea. L 8
	Curysantnemum corona-
rupestris. S. et Sm » iv	U rium I
Cardamine hirsuta. L » 42	' hvhri-
- impatiens. L. » ivi	dum Gues .
Carduus pycnocephalus.L. » 80	- Myco-
Carex distachya. Desf. » 28	nis. L.
- glauca. Mur » ivi	nis. L
- muricata. L » ivi	tum. L.
verna. Will » ivi	Cicer erictinum T
Carlina lanata. L » 80	"Cichorium Intubna I o
— involucrata. Desf. » 79	Cineraria maritima I 7
— sicula.Ten » 80	
- vulgaris. L 79	
Carthamus lanatus. L » 80	Cistaceae 4
Catapodium Ioliaceum.	Cistus monspeliensis. L. » 4
Lam 24	golvifolina T /
Caucalis nodosa. B. et H. » 74	l villogue I
Centaurea cineraria.L. » 80	Clematis Flammula. L 4
- cinerea. Lam. » ivi	Vitalla I
— solstitialis. L. » ivi	Clinopodium vulgare. L. » 6
Dufr	Colchicaceae 3
- ruber. D.C. » ivi	Colchicum autumnale. L. » iv
Cerastium glutinosum.Fr. « 47	Colutas orbanismos I
- pumilum.Curt. » ivi	Colutea arborescens. L. » 6
 pumilum.Curt. » ivi semidecandrum. 	Coniferae 25
L » ivi	
- vulgatum. L. » ivi	, , ,
Ceratonia Siliqua.L * 69	Convolvulus a theoides.L. » iv
Cerinthe aspera. Roth. » 53 Ceterach officinarum.W. » 21	- arvensis. L. » iv
Ceterach officinarum.W. » 21	- Cneorum. L. » iv
Chamaerops humilis. L. » 29	- italicus. R.
Cheiranthus Cheiri L. » 42	et Sch » iv
Chelidonium majus. L. » 41	- lineatus. L. » ivi
	- siculus. L. » ivi
Chenopodiaceae » 39	- silvaticus.W. » ivi
	- tenuissimus.
Chenopodium album. L. » ivi	S. et Sm » ivi
— murale. L. » 38	
- onulifolium	Cornaceae » 74
Schrad 39	Cornus sanguinea. L » ivi
vulvaria.L. » ivii	
Chlora imperfoliata. L. » 53	corollifloreae » 51
- perfoliata I 59	Coronilla Emanua I 60

Coronilla scorpioides.	Datura Stramomium. L. P. 55
Koch	Daucus bicolor. S et Sm. » 74
Koch P. 68 - valentina. L » ivi	- Carota. L » ivi
Corvnephorus articula-	— Gingidium. L » ivi
Corynephorus articulatus. PB	— Michelii. Car » ivi
Cotyledon horizontalia.L. » 71	Delphinium cardiopeta-
- umbilicus. L. » ivi	lum. D. C 40
Crassulaceae » ivi	peregrinum. L
	L 41
Crataegus oxyacantha. L. » ivi	Dianthaceae » 46
Crepis bulbosa. Cass » 83	
	Dianthus Caryophyllus.L. » ivi
All » ivi	prolifer. L » ivisilvestris. Wulf. » ivi
- neglecta. L » 1V1	silvestris. Wull. » 1VI
Crithmum maritimum. L. » 73	To : "
Crocus Imperati. Ten » 32	Scop
Crupina vulgaris. Cass. » 80	Scop » 20
Cucurbitaceae » 76	Dioscoreaceae » 29
Cuscuta Epithymum.	Diplotaxis tenuifolia. DC. » 43
Murr	
— planiflora. Ten. » ivi	Dipsaceae » 77
Cyclamen europaeum. L. » 61	Dorycnium hirsutum.Ser. » 67
- repandum. S.	D. C ivi
et Sm » ivi	D. C » ivi
Cynanchum Vincetoxi-	Draba verna. L
cum. Br	Ecballion Elaterium. Rich. » 76
Cynara Cardunculus. L. » 80	Echium calycinum. Vid. » 54
Cynodon Dactylon. Pers. » 26	- italicum. L » ivi
Cynoglossum creticum.	– plantagineum.L. » ivi
Vill	 plantagineum.L. » ivi pustulatum. S.
officinale.L. » ivi	et S » ivi
Cynosurus echinatus. L. » 26 — elegans. Desf. » ivi	Epilobiaceae » 71
Cyperaceae » 28	Eragrostis major. Host » 26
Cyperus olivaris. Targ. » ivi	i frica arnorea.L " 🕶
Cytisus hirsutus. L » 64	— multicaulis. Sal. » 52
- Laburnum. L. » ivi	Ericaceae » 51
- ramosissimus.	
Ten » ivi	Erigeron canadensis. L. » 77
- triflorus. l' Hér. » ivi	initolius. W. > 10
Dactylis glomerata. L » 25	Eronium cicutarium.
- hispanica. Roth. » ivi	
	- maiacoluce vi - " Ivi
Daphnaceae » 39	— moschatum.
Daphne Gnidium. L » ivi	l'Hér » ivi

Eruca sativa. Lam P. 43	Galium lucidum. All P. 75
Ervum hirsutum. Koch. » 69	— murale. All » ivi
Lens. L » ivi	- tricorne Vith wist
— longifolium. Ten. » ivi	- Vaillantia Wah wird
— monanthum, Ten. » ivi	Gastridium lendigerum.
— tetraspermum. L. » ivi	Gaud
Eryngium maritimum. I. > 72	Gaudinia fragilis. PB 23
Erysimum barbarea. R.	Caudinia Hagilis. Fb * 25
Brown	Gentianaceae » 52
Erythraea Centaurium.	Gentianaceae » 52
Pers	Geraniaceae » 50
Pers	
des. L	Geranium columbinum.L. > 50
- Characias. L. » ivi	— dissectum. L. » ivi
dendroides.L. » ivi	— molle. L » ivi — Robertianum.L. » ivi
- falcata. L » ivi	- Robertianum.L. » ivi
- helioscopia.L. » ivi	- rotunanonum.
	L vi
— peplis. L » 36	L vi Gladiolus illyricus. Koch. » 32
— peplus. L » 37	- segetum. Gawl. » ivi
- pinea. L » ivi	Glaucium flavum. Crantz. » 41
- spinosa. L » 36	Globularia cordifolia. L. » 61
Euphorbiaceae » 36	
	Globulariaceae » ivi
Evax pygmaea. Pers » 79	Grammitis leptophylla.
Evonymus europaeus. L. » 63	Grammitis leptophylla. Sw 21
Fedia cornucopiae.Gaertn. » 76	
Festuca alopecuros. Lam. » 25	GYMNOSPERMEAE » 22
- ovina. L » ivi	Gypsophila saxitraga. L. » 46
- silvatica. Vill » ivi	Hedera helix. L 74
Filago germanica. L » 79	Hedypnois cretica. W 81
FILICINEAE » 21	Helianthemum Fumana.
filicineae » 21	Mill
Foeniculum capillaceum.	— alananm
Gilib	Pers » ivi
Fragaria elatior. Ehrb. » 70	Pers » ivi — guttatum. Mill » ivi — italicum. Pers » ivi
- vesca. L » ivi	Mill » ivi
Fraxinus ornus. L » 52	- italicum.
Fumaria capreolata. L. » 41	Pers » ivi
- officinalis. L. » ivi	- laevines.
- parviflora.Lam. » ivi	— italicum. Pers » ivi — laevipes. Presl » ivi — thymifo-
- serotina. Guss. » 42	- thymifo-
- Vaillanti. Lois. » 41	lium. Pers » ivi
Galactites tomentosa.	- vulgare
Moench 80	lium. Pers » ivi — vulgare. Gaert » ivi Helichrysum litoreum.
Galium Anarine, L	Helichrysum litoreum
Galium Aparine. L » 75 — Cruciata. Scop. » ivi	Giles ~ 70
Oraciata. Doop. #141	Jupp 710

Heliotropium Eichwaldi.	Iris germanica. L P. 32
Steud	
europaeum.	Juncaceae » 29
L vivi Helminthia echioides.	Juniperus phoenicea. L. » 23
Gaertn 82	Kochia saxicola. Guss. » 39
Gaertn 82 Herniaria hirsuta. L 48	Roeieria pilieoides. Pers. » 21
Hieracium crinitum. S.	Kopsia coerulea. Dum. » 58
et Sm 83	- ramosa. Dum » ivi
- praealtum.	Lactuca murans. Fres. » 62
Vill » ivi	— saligna. L » ivi
Vill » ivi Himantoglossum hirci- num. Spr » 33 Hippocrepis ciliata. W. » 68	Lagurus ovatus. L » 21
num. Spr » 33	Lamiaceae » 58
Hippocrepis ciliata. W. » 68	Lamiaceae
unisiliquo-	Lamium ampiexicallie. L. » OU
sa. L » ivi Holcus lanatus. L » 28 Hordeum bulbosum. L. » 24	— flexuosum. Ten. » ivi
Hordon hulbour I 24	purpureum. L » ivi
- muminum I. wivi	Hothwaya olotya Ton 80
— mamam. 2. % 141	Anhaca I wivi
leporinum. (Lam.). , » ivi	- Cicera, I » ivi
- vulgare. L » ivi	- Clymenum.Ten. » ivi
leporinum. (Lam.) » ivi vulgare. L. » ivi Hymenocarpus circinna- tus. Savi 64 Hyosciamus albus. L » 55 Hyoseris lucida L	- sativus. L » ivi
tus. Savi » 64	— variegatus.Godr.» ivi
Hyosciamus albus. L » 55	Lavandula officinalis.
Hyoseris lucida L » 81 — scabra. L » ivi	Chaix
— scabra. L » ivi	Lavatera arborea. L » 49
T 10	— cretica. L » ivi
Hypericaceae » 49	Lemna gibba. L » 29
Hypericum androsaemum.	Lemnaceae » 29
L » ivi	Leontodon saxatilis.
- nircinum. L. » ivi	Rehb 81
— perfoliatum.L.» ivi	Lepidium graminifolium.
Hypochaeris aetnensis. B.	L
et H 81	Ligustrum vulgare. L. » 52
— glabra. L » ivi	
neapolitana.	Lilium bulbiferum. L. » 30
D.C vi	- candidum. L » ivi
D.C » ivi Inula Conyza. D.C » 79	Limodorum abortivum.
— graveolens. Dest » ivi	Sw
— viscosa. Ait » ivi	Linaria chalepensis. Mill. » 56
	- commutata.
Iridaceae » 32	
Iris florentina. L » ivi	— cymbalaria. Mill. » ivi — Elatine. Mill » 57
— foetidissima. L » ivi	Elatine. Mill » 57

Linaria minor. Desf P. 56	Matthiola rupestris.Guss. P. 42
 Pelicieriana.Mill. » ivi 	Medicago arabica. L » 65
— purpurea. Mill. » ivi	– arborea. L » ivi
- spuria. Mill » ivi	
Linum angustifolium.	— litoralis.Rohde. » ivi
Huds 51	– lupulina. L » 64
— decumbens. Desf. » ivi	— minima. Desr. » 65
— gallicum. L » ivi	— Murex. W » ivi
- nodiflorum. L » ivi	_— muricoleptis.
- strictum. L » ivi	Ten » ivi
- tenuifolium. L » ivi	— orbicularis. All.» ivi
— usitatissimum. L. » 50	— praecox. D. C. » ivi
Lithospermum officinale.	— rigidula. Lam. » ivi
L	— tribuloides.Desr.» ivi
— purpureo- cœruleum. L » ivi	- tuberculata.
	Willd » 64 Melica ciliata. L » 27
- rosmarini-	Melica ciliata. L » 27
folium. Ten » ivi	– cœrulea. L » ivi
	Melilotus indica. All » 65
- perenne. L » ivi	– infesta. Guss. » ivi
- temulentum. L » ivi	– italica. Lam. » ivi
Lonicera etrusca. Savi. » 76	neapolitana.
— implexa. Ait. » ivi	— infesta. Guss. » ivi — italica. Lam. » ivi — neapolitana. Ten » ivi — sulcata. Desf. » ivi
	– sulcata. Desf. » ivi
Loniceraceae » ivi	Melissa calamintha. L. » 59
	- officinalis. L » ivi
Loranthaceae » 39	Mentha macrostachya.
Lotus angustissimus. L. » 67	Ten » 58 — Pulegium. L » ivi
- cytisoides. L » ivi	- Pulegium. L » ivi
- edulis. L » ivi	Mercurialis annua. L » 37
- ornithopodioides.L. » ivi	75 , , , , , ,
- uliginosus. Schk. » ivi	mesemoryaninemaceae » 12
Lupinus angustifolius. L. » 63	Mesembryanthemum no-
- Termis. Forsk » ivi	diflorum. L » ivi
Luzula campestris. D.C. » 29	Mespilus germanica. L. » 71
- Forsteri. D.C » ivi	Micromeria approxima-
Lychnis cœli-rosa. Desv. » 47	ta. L 61
— dioica. L » ivi	— tenuifolia.
Lycopsis variegata. L » 54	Ten » ivi Moehringia muscosa. L. » 48
Lysimachia stellata. L » 61	Moenringia muscosa. L. » 48
Malva alcea. L » 49	— trinervia.
- parviflora. Cav » ivi	Clair » ivi
- silvestris. L » ivi	**************************************
	monochlamydeae » 35
Malvaceae » ivi	MONOCOTYLEAE » 23
	Muscari botrvoides. Mill. » 31

Muscari comosum. Mill. P. 30	Orchis Cyrilli. Ten P. 34
Myosotis arvensis. With. » 54	– italica. Poir » 33
- versicolor. Lk. » ivi	— maculata. L » 34
	– mascula. L » ivi
Myrtaceae » 71	 Morio. L » ivi papilionacea. L. » 33
Myrtus communis. L » ivi	— papilionacea. L. » 33
Narcissus Tazetta. Lois. » 32	— pyramidalis. L. » 34 — rubra. Jacq » 33 — Simia. Lam » 34
— Tenorii. Parl. » ivi	— rubra. Jacq » 33
unicolor.Ten. » ivi	
Nasturtium officinale. R.	Oliganum viiens, niec n. " oo
	– vulgare. L » 58
Brown	Ornithogalum nutans. L. » 30
Nephrodium rigidum. Desv.» 21	— stachyoi-
Nerium odorum. Ait » 52	— stachyoi- des. L » ivi
Nicella demagana I 41	— umbella- tum. L » ivi
Nigella damascena. L » 41 Odontites lutea. Stev » 57	tum. L » ivi
- serotina. Rchb. » ivi	Ornithopus compressus.L. » 68
Oenanthe chaerophylloi-	Orobanchaceae » 58
des. L	
Orchidaceae » 33	Orobanche canescens.
Oremaaceae » 55	Presl » ivi — ciinita. Viv » ivi
0/	– ciinita. Viv» ivi
Oleaceae · · · · » 52	– gracilis. Sm » ivi
Olea europaea. L » ivi	— gracilis. Sm » ivi — pruinosa. La- peyr » ivi — rubens. Wallr. » ivi — Spartii. Vauch. » ivi
Onobrychis caput-galli.	peyr » ivi
Lam	– rubens.Wallr. » ivi
Ononis Columnae. All » 63	— Spartii.Vanch.» ivi
- ornithopodioides.	Orobus vernus. L » 70
L	Osyris alba. L » 39
— reclinata. L » 63	Oxalis cernua. Thumb. » 50
— Sieberi. Boss » 64	
— viscosa. L » 63	— stricta. L » ivi
Onopordon illyricum. L. » 80	
tauricum. W. » ivi	Palmae
Ophioglossum lusitani-	
cum. L 21	Papaver argemone. L » 41
Ophrys Arachnites. Host. » 34	– dubium. L » ivi
— aranifera. Huds. » ivi — bombilifera. Link. » ivi	 dubium. L » ivi hybridum » ivi Rhoeas. L » ivi
 bombilifera. Link. » ivi 	— Rhoeas. L » ivi
— exaltata. Ten » ivi	
- myodes. Jacq » ivi	
- tenthredinifera.W.» ivi	
Opuntia amyclaea. Ten. » 72	Parietaria cretica. L » 36
- Ficus-Indica.	 — officinalis. L. » ivi — officinalis. β. diffusa (M. et K.) » ivi
Mill » ivi	— officinalis. β.
Orchis coriophora. L » 34	diffusa (M. et K.) » ivi

Paronychiaceae P. 48	Polygalaceae P. 48
Phagnalon rupestre. D.C. » 79	Polygonaceae » 37
Phalaris canariensis. L. « 27	Polygonum aviculare. L. » ivi
	— convolvulus.
Phaseolaceae » 63	L » ivi
Phleum Boehmeri. Wib. » 27	- dumetorum.
— Michelii. All » ivi	L » ivi — herniaioides.
Pnyllirea variabilis. Timb.	Del » ivi
et Lor	
et Lor » 52 Phytolacca decandra. L. » 38	Polypodiaceae » 21
	Polypodium vulgare. L. » ivi
Phytolaccaceae » ivi	Populus alba. L » 35 — nigra. L » ivi
Picridium vulgare. Desf. » 82	— nigra. L » ivi — tremula. L » ivi
Picris hieracioides. L » 81	remula. L » ivi
Pimpinella magna. L » 73	Portulaca oleracea. L » 48
Pinus montana. Duroi. » 23	Portulacaceae » ivi
pinea. L » 22halepensis. Mill. » ivi	
- halepensis. Mill. » ivi	Potentilla reptans. L » 70 Poterium muricatum.
Piptatheram multiflorum.	Spach » ivi
Palis » 27	- sanguisorba.L. » ivi
Pistacia lentiscus. L » 63	Prasium majus. L » 60
- Terebinthus. L. » ivi Pisum sativum. L » 69	Trasian majus. 11
risum sativum. L » 09	Primulaceae » 61
Plantaginaceae » 62	Primula vulgaris. Huds. » ivi
Plantago Bellardi. All. » ivi	Prunus insititia. L » 70
- Coronopus. L. » ivi	Psilurus nardoides. Trin. » 23
- Lagonus, L. wivi	Psoralea bituminosa. L. » 67
- lanceolata. L. » ivi	Pteris aqui!ina. L » 22
- major. L » ivi	Punica Granatum. L » 71
- Psyllium. L » ivi	0
Platanthera clorantha.	Quercaceae » 35
Kust 35	Quercus cerris. L » ivi
	– Ilex. L » ivi
Plumbaginaceae » 62	- robur. L » ivi - suber. L » 36
Poa annua. L 25	
bulbosa. L » ivicompressa. L » 26	Ranunculaceae » 40
— compressa. L » 26	Ranunculus chaerophyl-
	los. L vivi
Poaceae » 23	- ficaria. L » ivi
Polycarpon tetraphyllum.	— muricatus.L.» ivi
L	Raphanus raphanistrum.
Polygala monspeliaca. L. » 48	Ĺ .

Reseda alba. L P. 44	Sambucus nigra. L P. 76
- luteola, L » ivi	Samolus Valerandi. L » 62
Reseda alba. L P. 44 — luteola. L » ivi — odorata. i » ivi	Sanicula europaea. L » 73
Resedaceae » ivi	Santalaceae » 39
Rhagadiolus stellatus.W. » 81	Saponaria officinalis. I. » 46
	Saturaja granca I " 50
Rhamnaceae » 63	– Juliana. L » ivi
Rhamnus alaternus. L. » ivi	– montana. L » ivi
Ricinus communis. L » 37	C: 6
Romulea bulbocodium.	
Seb 32	Saxifragaceae » ivi
Rosa rubiginosa. L » 70	Scahiora Columbania I . 77
- sempervirens. L » ivi	- aronata Cun nivi
remper virens. E	- cremata. Cyr » ivi
Rosaceae » ivi	— credica. L » ivi
-	— grandiflora.
Rosmarinus officinalis. L. » 59	5000
Rotthoellia incurvata, L. » 23	Scandix Pecten-Veneris.L.» 73
Rubia Bocconii, Pet » 75	Schoenus nigricans, L » 28
- peregrina. L » ivi	Scilla autumnalis. L » 30
	Scleranthus annuus. L. » 49
Rubiaceae » 74	Sclerochloa maritima.
	Lam 24
Rubus discolor. W. et N. » 70	- rigida, Panz. » ivi
Rumex acetosa. L » 38	Scolopendrium Hemioui-
- arifolius. All » ivi	tis. Sw » 22
 bucephalophorus. L » ivi pulcher. L » ivi 	officina- rum. Sw » ivi
L » ivi	ıum. Sw » ivi
- pulcher. L » ivi	Scolymus grandiflorus.
Ruscus aculeatus. L » 30 Ruta bracteosa. D. C » 51	Desf 80
Ruta bracteosa. D. C » 51	- hispanicus. L. » ivi
— chalepensis. L » ivi	Scorpiurus subvillosa. L. » 69
-	Scorzonera Columnae.
Rutaceae » ivi	Guss 82
Sagina apetala. L » 48	Scrophularia canina. L. » 56
— maritima. Don » ivi	peregrina.L.» ivi
Salicaceae » 35	Scrophulariaceae » 55
33. 3	Sedum altissimum. Poir. » 72
Salix Caprea. L » ivi	— Cepaea. L » ivi
Salsola Kalı. L » ivi	— dasyphyllum. L. » ivi
Salvia clandestina. L » 59	litoreum. Guss » ivi
 officinalis. L » ivi verbenaca. L » ivi 	- rubens. L » ivi - stellatum. L » 71
— verbenaca. L » ivi	- stellatum. L » 71

Selaginella denticulata.	Spiranthes autumnalis.
Lam	⁻ Rich
Selaginellaceae » 22	Stachys arvensis. L » 59
Senecio vulgaris. L » 78	– silvatica. L » 59
Serapias cordigera. L » 33	Statice cancellata_Bernh. » 62
— elongata. Tod » ivi	cumana. Ten » ivivirgata. W » ivi
— lingua. L » ivi	— virgata. W » ivi
— parviflora. Parl. » ivi	Stellaria media. Vill » 47
— pseudo-cordigera.	Stipa tortilis. Desf » 27
Moris » ivi	Stipa tortilis. Desf » 27 Succowia balearica.Med. » 43 Symphytum tuberosum.L. » 54
Seseli montanum. L » 73	Symphytum tuberosum.L.» 54
Sesleria tenuifolia.	Tamus communis. L » 29 Taraxacum vulgare.Lam. » 82
Schrad » 25	Taraxacum vulgare.Lam. » 82
Setalia gialica, PD., . » 20	Letragonologus purpureus.
- verticillata. PB. » ivi	Moench » 67
- viridis. PB » ivi	Teucrium campanulatum.
Sherardia arvensis. L » 74	
Sideritis romana. L » 59	 Chamaedrys. L.» ivi
Silene cerastoides. L * 47	– flavum. L » ivi
— cucubalus. Wib » ivi	— fruticans. L. » ivi
— gallica. L , » 46	— montanum. L. » ivi
— italica. Pers » 47	
Sinapis nigra. L * 44	THALAMIFLOREAE » 40
Sisymbrium officinale.	
Scop 42	Thapsia Asclepium. L » 74
Scop 42	Thapsia Asclepium. L » 74
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynocrambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynocrambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynocrambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynocrambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynocrambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynociambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynociambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynociambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynociambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynociambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynocrambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynociambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynociambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynociambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynociambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynociambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynociambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynociambe. L
Scop	Thapsia Asclepium. L » 74 Theligonum Cynociambe. L

Trifolium arvense. L P. 66 V	erbascum sinuatum. L. P. 55
Roggonai Savi wivi	— Thansus, L. » 1V1
- brutium. Ten. » 67 V	erbena officinalis. L » 61
Cherleri L » 66	
- incarnatum, L. » ivi	Verbenaceae » ivi
- lappaceum, L. » ivi V	eronica agrestis. L » 57
- ligusticum.	- arvensis. L » ivi
Balb » ivi	— cymbalaria.Bod.» ivi
- pratense. L. » ivi	— didyma. Ten » ivi
- procumbens.L. » ivi	— hederaefolia. L. » ivi
- repens. L » ivi	— Tournefortii.
- resupinatum.L.» ivi	aii
- scabrum. L » ivi	Gm
- stellatum. L. » ivi	Vicia angustifolia. All. » 68
	— bithynica. L » 69
— subterraneum.	— Faba. L » 68
L » ivi	— Gerardi. Vill » ivi
— suffocatum. L. » ivi	— graci is. Lois » 69
- tomentosum.L. » ivi	— nybrida. L » 68
Tulipa praecox. Ten » 30	- leucantha. Biv » ivi
Tussilago Farfara. L » 77	— narbonensis. L » ivi
Ulex europaeus. L » 64	- ochroleuca. Ten. » ivi
Ulmus suberosa. Ehrh. » 36	— pseudo-cracca.
Urginea scilla. Steinh » 30	Bert » ivi
Urospermum Dalescham-	sativa. L
pii. Desf 81	
— picroides.	- varia. Host » ivi
Desf » ivi Urtica dioica. L » 36	Vinca major. L » 52
Urtica dioica. L » 36	— minor. L » ivi
- membranacea.	Viola canina » 46
— membranacea. Poir » ivi	- hirta, L » ivi
- pilulifera, L » ivi	— odorata. I » 45
pilulifera. L » iviurens. L » ivi	— silvatica. Fr » 46
— diomy 2	- tricolor. L » ivi
	— theolor. B
Urticaceae · · · » ivi	Violaceae » 45
Vaillantia muralis. L » 75	Viscum album. L » 39
Valeriana eriocarpa.Desv. » 76	Vitex agnus-castus. L » 61
	Vulpia ciliata. Lam » 25
Valerianaceae » ivi	– myuros. Gm » IVI
	Xanthium spinosum, L. » .9
Ventenata avenacea. Koel. » 28 Verbascum Blattaria. L. » 55	— strumarium.
Verbascum Blattaria. L. » 55	L » ivi
- Boerhavii, L. » ivi	Zacintha verrucosa.
nigrum, I. » 56	Gaertn 82
mgrum. D # 60	1 0.000.000



Oglized by Google

